Маример Форте



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Аэрозоль назальный***	**100 мл**
стерильный изотонический раствор морской воды	31.82 мл

Вспомогательные вещества: вода очищенная - до 100 мл.

50 мл - баллоны аэрозольные алюминиевые (1) с распылительной насадкой и колпачком - пачки картонные.
100 мл - баллоны аэрозольные алюминиевые (1) с распылительной насадкой и колпачком - пачки картонные.

◊ ***Капли назальные***	**100 мл**
стерильный изотонический раствор морской воды	31.82 мл

Вспомогательные вещества: вода очищенная - до 100 мл.

5 мл - флакон-капельницы пластиковые (6) - пачки картонные.
5 мл - флакон-капельницы пластиковые (12) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки носа.

Способствует разжижению слизи и облегчает ее удаление из носа. Микроэлементы, входящие в состав препарата, улучшают функцию мерцательного эпителия, что усиливает резистентность слизистой оболочки носа к болезнетворным бактериям и вирусам. При аллергических ринитах способствует удалению аллергенов со слизистой оболочки носа.

Микродиффузионная система распыления препарата обеспечивает глубокое и мягкое орошение слизистой оболочки носа, что способствует эффективному воздействию микроэлементов.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Маример не предоставлены.

Показания к применению:

— острые и хронические воспалительные заболевания носа, придаточных пазух и носоглотки;

— профилактика инфекционных заболеваний носа и носоглотки;

— аллергический и вазомоторный риниты;

— профилактика воспалительных процессов после оперативных вмешательств;

— ежедневная гигиена носовой полости для сохранения защитных свойств слизистой в условиях повышенной сухости или загрязнения воздуха (в т.ч. кондиционирование, центральное отопление).

Относится к болезням:

- Аллергия
- Инфекции
- Ринит

Противопоказания:

— детский возраст до 1 года (для аэрозоля назального);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат применяется интраназально.

Аэрозоль назальный: **детям старше 1 года и взрослым** назначают по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход *с лечебной целью* 4-6 раз/сут, *с гигиенической целью* - 1-4 раза/сут.

Капли назальные: **детям в возрасте до 1 года** назначают минимум по 2 кап. в каждый носовой ход с *лечебной целью* 4 раза/сут; **детям старше 1 года и взрослым** - по 2 кап. в каждый носовой ход *с лечебной целью* 4-6 раз/сут, *с гигиенической целью* - 1-4 раза/сут.

Детям в возрасте до 2 лет промывание полости носа следует производить в положении лежа. Следует повернуть голову ребенка набок, промыть верхний носовой ход, затем повторить процедуру с другим носовым ходом. Посадить ребенка, вытереть выделения из носа.

Детям старше 2 лет и в**зрослым** следует наклонить голову набок, промыть верхний носовой ход, повторить процедуру с другим носовым ходом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата Маример при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат не оказывает системного воздействия на организм, взаимодействия с другими лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами в составе комбинированной терапии.

Особые указания и меры предосторожности:

Необходимо консультация врача, если препарат применяется после операции.

Безопасная и удобная насадка позволяет без риска применять препарат у новорожденных. Одноразовый флакон открывают поворотом насадки. Насадка полностью отделяется и может быть использована для закрывания флакона. Открытый флакон следует использовать в течение суток.

Применение в детском возрасте

Препарат применяют в соответствующей лекарственной форме и в дозах, учитывающих возраст пациента.
Противопоказание: детский возраст до 1 года (для аэрозоля назального).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Marimer_Forte