Мастопол (гранулы)



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки подъязычные гомеопатические.

В контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ и фольги алюминиевой печатной лакированной по 10 шт. 6 контурных ячейковых упаковок в пачке из картона.

Состав:

Таблетки подъязычные гомеопатические	1 табл.
активные вещества:	
Thuja occidentalis (Thuja) (туя окциденталис (туя) С6	0,075 г
Conium maculatum (Conium) (кониум макулатум (кониум) С6	0,075 г
Hydrastis canadensis (Hydrastis) (гидрастис канаденсис (гидрастис) С3	0,075 г
Calcium fluoratum (кальциум флюоратум) С6	0,075 г
вспомогательные вещества: в т.ч. лактоза моногидрат — 0,282 г; крахмал картофельный — 0,015 г; кальция стеарат — 0,003 г	

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — гомеопатическое.

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено, компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению:

В комплексном лечении фиброзно-кистозной мастопатии, мастодинии.

Относится к болезням:

- Мастит
- Мастопатия
- Фиброз
- Фиброма

Противопоказания:

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Препарат не применяют при лечении злокачественных заболеваний молочной железы. Возраст до 18 лет. Сахарный диабет I типа. Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Способ применения и дозы:

По 8 гранул 3 раза в день под язык до полного растворения за полчаса до еды или через 1 ч после еды. Курс лечения 8 недель. Возможно повторение курса по согласованию с врачом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции. До настоящего времени информация о случаях побочных эффектов не поступала.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение препарата проводят строго по назначению и под наблюдением врача-маммолога. При приеме гомеопатических препаратов может отмечаться временное обострение симптомов. В этом случае следует обратиться к врачу.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 30 дней, а также появлении побочных эффектов, следует обратиться к врачу.

Информация для больных сахарным диабетом: содержание углеводов в максимальной суточной дозе препарата соответствует 0.114 хлебной единицы.

Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и.т.п.).

Условия хранения:

Препарат хранят в защищенном от света месте при температуре от 15 до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Mastopol_granuly