Матарен плюс



Код АТХ:

- M02AX10

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Мелоксикам
- Перца стручкового плодов настойка

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Крем для наружного применения от светло-желтого до темно-желтого цвета; допускается зеленоватый оттенок.

	1 г
мелоксикам	30 мг
настойка плодов перца стручкового	100 мг

Вспомогательные вещества: хлороформ - 25 мг, масло кориандра (эфирное масло кориандровое) - 2.5 мг, масло лаванды (эфирное масло лавандовое) - 2.5 мг, парафин жидкий (масло вазелиновое медицинское) - 50 мг, пропиленгликоль - 25 мг, стеариновая кислота - до 20 мг, моноглицериды дистиллированные - до 20 мг, воск эмульсионный - 7.5 мг, глицерол (глицерин дистиллированный) - 25 мг, полоксамер (эмуксол-268) - 5 мг, карбомер (карбопол) - 3 мг, натрия гидроксид - 600 мкг, имидомочевина (Germall) - 3 мг, вода очищенная - до 1 г.

20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
100 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
20 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
30 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
40 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
50 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
100 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Матарен Плюс оказывает противовоспалительное, анальгезирующее, противоотечное действие, может вызывать легкую локальную гиперемию кожи, не оказывая при этом выраженного раздражающего действия на кожные покровы.

Матарен Плюс уменьшает боль в суставах (в т.ч. в суставах позвоночника) и в мышцах в покое и при движении, способствует увеличению объема движения суставов (в области нанесения крема). Уменьшает утреннюю скованность и припухлость суставов.

Мелоксикам избирательно ингибирует циклооксигеназу 2, нарушает метаболизм арахидоновой кислоты, уменьшает в очаге воспаления количество простагландинов (медиаторов боли и воспаления).

Настойка перца стручкового содержит капсаицин, обладающий раздражающим действием на чувствительные рецепторы кожи, что приводит к местному анальгезирующему эффекту, к улучшению кровообращения в коже и подкожной клетчатке, а также разогревающему эффекту. Улучшение местного кровотока сопровождается усилением кровообращения в подлежащих тканях, что способствует удалению субстрата воспаления из патологического очага.

Благодаря оптимальному сочетанию компонентов крема отмечается взаимное усиление их анальгезирующего и противовоспалительного эффектов. При совместном воздействии активные компоненты крема Матарен Плюс оказывают больший эффект за счет синергизма, по сравнению с индивидуальным эффектом каждого из этих компонентов.

Показания к применению:

— воспалительные и дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата;

— ревматические поражения мягких тканей;

— болевой синдром: бурсит, тендинит, люмбаго, ишиас, невралгия, миалгия, артралгия, радикулит, посттравматический болевой синдром (травматические ушибы, вывихи, растяжения связок, мышц и сухожилий, разрывы мышц без нарушения целостности кожных покровов), болезненность мышц и суставов, вызванных тяжелыми физическими нагрузками.

Относится к болезням:

- Артралгия
- Артрит
- Артроз
- Болевой синдром
- Бурсит
- Вывих
- Вывихи
- Ишиас
- Люмбаго
- Миалгия
- Невралгия
- Неврит
- Радикулит
- Растяжение
- Ревматизм
- Тендинит
- Травмы
- Ушиб
- Ушибы

Противопоказания:

— детский возраст до 12 лет;

— нарушения целостности кожных покровов и воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения препарата;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует назначать препарат при нарушении функций почек и печени, выраженной патологии ЖКТ (язвенная болезнь желудка и двенандцатиперстной кишки в фазе обострения), выраженной патологии системы крови, в детском возрасте от 12 до 18 лет.

Способ применения и дозы:

Наружно. Слегка втирают полоску крема длиной от 1 до 5 см, кратность применения - 1-3 раза/сут. Количество крема и частота применения могут варьировать в зависимости от площади нанесения и индивидуальной реакции на крем. Для усиления эффекта можно наложить сухую согревающую повязку.

Побочное действие:

Возникающие побочные эффекты зависят от индивидуальной чувствительности.

Возможны *аллергические реакции* со стороны кожи (зуд, кожная сыпь), шелушение кожи, гиперемия.

При появлении каких-либо побочных эффектов пациент должен прекратить применение крема и обратиться к врачу.

Передозировка:

Случаи передозировки препарата Матарен Плюс неизвестны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата противопоказано при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В настоящее время нет данных о взаимодействии препарата Матарен Плюс с другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует избегать попадания препарата на поврежденную поверхность кожи, в глаза и на слизистые оболочки. При попадании крема Матарен Плюс на данные участки следует удалить его с помощью ватного тампона, пропитанного вазелином или растительным маслом.

После использования препарата необходимо тщательно вымыть руки.

Пациенту следует проконсультироваться с врачом перед совместным применением крема Матарен Плюс с другими НПВС, а также при необходимости использования препарата более 10 суток.

При нарушениях функции почек

С *осторожностью* следует назначать препарат при нарушении функций почек.

При нарушениях функции печени

С *осторожностью* следует назначать препарат при нарушении функций печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 12 лет.

С *осторожностью* следует назначать препарат в подростковом возрасте от 12 до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Mataren_plyus