

[Мазь Кузнецова](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает местнораздражающее и противовоспалительное действие.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

- артралгия;
- миалгия;
- невралгия;
- боль в нижней части спины;
- миозит;
- ишиас;
- спортивные травмы (ушибы и травмы суставов с растяжением связок и мышц).

Относится к болезням:

- [Артралгия](#)
- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Ишиас](#)
- [Миалгия](#)
- [Невралгия](#)
- [Неврит](#)
- [Растяжение](#)
- [Травмы](#)
- [Ушиб](#)
- [Ушибы](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- заболевания почек;
- заболевания печени;
- психические заболевания;
- туберкулез;
- сахарный диабет;
- заболевания кожи;
- нарушение целостности кожных покровов в месте предполагаемого нанесения мази;
- беременность;
- период лактации.

Способ применения и дозы:

Наружно. Мазь наносят на болезненные участки тонким слоем (около 1 мм) и втирают в кожу до полного впитывания в течение 5-10 мин. В зависимости от интенсивности боли процедуру повторяют до 3 раз/сут.

Рекомендуется проводить процедуру через 30-50 мин после приема пищи; не рекомендуется проводить процедуру натощак.

Для усиления действия мази перед применением рекомендуется промыть область нанесения теплой водой с мылом, после втирания обернуть болезненный участок шерстяной тканью.

Курс лечения - 15 дней, но не более 3 нед. При необходимости, после 2-3 недельного перерыва, возможно проведение повторного курса.

Побочное действие:

Аллергические реакции (гиперемия кожи, зуд, крапивница, отек), ощущение жжения в месте нанесения в течение нескольких минут.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности, в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Не наносить мазь на открытые раны и поврежденные участки кожи.

После применения тщательно вымыть руки (пчелиный яд при попадании в глаза и на слизистые оболочки может вызвать раздражение).

Перед первым применением мази целесообразно предварительно нанести мазь на небольшой участок кожи, т.к. в отдельных случаях пчелиный яд может вызвать развитие аллергических реакций, при появлении которых необходимо смыть мазь теплой водой с мылом; в дальнейшем применять препарат не следует.

При длительном непрерывном применении возможно ослабление терапевтического эффекта.

Лечение должно сопровождаться молочно-растительной диетой, богатой витаминами и минеральными солями; не рекомендуется употребление этанола, острой, соленой, копченой пищи и пряностей.

В период лечения не рекомендуется принимать горячие и холодные водные процедуры, посещать парную, сауну; следует избегать эмоциональных и физических нагрузок.

Мазь Кузнецова

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

При нарушениях функции почек

Противопоказан при заболеваниях почек.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при заболеваниях печени.

Источник: http://drugs.thead.ru/Maz_Kuznecova