

Мебикар



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки	1 таб.
тетраметилтетраазабициклооктандион-мебикар	300 мг
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.	
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.	

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат относится к анксиолитическим, стресс-протективным, ноотропным средствам. Улучшает кислородное обеспечение тканей миокарда; нормализует нарушенный электролитный баланс крови, содержание ионов калия в плазме, эритроцитах и клетках миокарда; способствует усилению белкового синтеза и увеличению энергетических ресурсов клетки.

Регулирует нарушенный ночной сон, не оказывая прямого снотворного действия. Не обладает холинолитическим и миорелаксантным эффектом, не нарушает координацию движений. Облегчает или снимает никотиновую абстиненцию.

Фармакокинетика

Выводится с мочой полностью в течение суток.

Показания к применению:

— для лечения невротических расстройств (раздражительность, эмоциональная лабильность, тревога, тревожно-депрессивные, фобические, панические расстройства), развившихся в результате истощающих психо-эмоциональных, нервно-психических и физических нагрузок;

— в комплексной терапии для лечения больных с кардиалгиями, ишемической болезнью сердца и реабилитации после инфаркта миокарда;

— для уменьшения влечения к курению табака;

— при неврозоподобных состояниях у больных алкоголизмом, для снижения патологического влечения к алкоголю и психоактивным веществам;

— для улучшения переносимости нейролептиков и транквилизаторов.

Относится к болезням:

- [Алкоголизм](#)
- [Депрессия](#)
- [Кардиалгия](#)
- [Кардит](#)
- [Миокардит](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)
- [Паническое расстройство](#)

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Внутрь, по 0.3-0.9 г 2-3 раза в день (независимо от приема пищи). Максимальная разовая доза - 3 г, суточная - 10 г. Курс для профилактики и лечения от нескольких дней до 2-3 мес, в зависимости от ситуации, при психических заболеваниях до 6 мес.

Побочное действие:

Аллергические реакции (кожный зуд), при высоких дозах - кратковременное незначительное снижение артериального давления, гипертермия (повышение температуры тела на 1-1.5° С), диспепсические расстройства. Снижение артериального давления и температуры тела не являются показаниями для отмены препарата и нормализуются самостоятельно.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает эффект снотворных и наркотических средств.

Условия хранения:

Список Б. В сухом месте. Хранить в недоступном для детей.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Mebikar>