

Медицинский Антисептический Раствор



Код АТХ:

- [D08AX08](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Этанол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Раствор для наружного применения прозрачный, бесцветный, с характерным запахом спирта.

	1 фл.
этанол 95%	67.5 г

Вспомогательные вещества: вода очищенная до 100 г.

100 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептик.

Показания к применению:

— лечение начальных стадий заболеваний: фурункул, панариций, мастит;

— обработка рук хирурга (способы Фюрбрингера, Альфреда), операционного поля (в т.ч. у лиц с повышенной чувствительностью к другим антисептикам, у детей и при операциях на областях с тонкой кожей у взрослых - шея, лицо).

Относится к болезням:

- [Мастит](#)

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

С осторожностью

— детский возраст.

Способ применения и дозы:

Наружно, в виде примочек. Для обработки операционного поля и предоперационной дезинфекции рук хирурга.

Побочное действие:

Аллергические реакции, ожоги кожи, гиперемия и болезненность кожи в месте наложения компресса.

При наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки и может оказывать резорбтивное общетоксическое действие (угнетение центральной нервной системы).

Применение при беременности и кормлении грудью:

Специальных исследований применения при беременности и в период лактации не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для ребенка и пользы для матери.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Специальных исследований не проводилось в связи с применением лекарственного препарата для наружного применения.

Особые указания и меры предосторожности:

Этанол при наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки, что нужно учитывать при его использовании у детей, беременных женщин и в период лактации.

Сведения о возможном влиянии на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Необходимо воздерживаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Применение в детском возрасте

Специальных исследований применения детьми не проводилось. Следует соблюдать осторожность при назначении детям

Условия хранения:

При температуре от 8° до 15°С, в хорошо укупоренной таре. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Medicinskiy_Antisepticheskiy_Rastvor