Мегадин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые оболочкой*** коричневого цвета, круглые, двояковыпуклые.

	1 таб.
ретинол	10 тыс.МЕ
колекальциферол	500 МЕ
токоферол	10 мг
тиамин	20 мг
рибофлавин	5 мг
пиридоксин	10 мг
аскорбиновая кислота	150 мг
цианокобаламин	5 мкг
биотин	250 мкг
никотинамид	50 мг
пантотеновая кислота	11.6 мг
кальций	50 мг
фосфат	25.8 мг
магний	36.2 мг
железо	10 мг
медь	1 мг
цинк	500 мкг
марганец	500 мкг
молибден	100 мкг

Вспомогательные вещества: натрия кроскармеллоза (асдисол), D-маннитол, тальк, поливинилпирролидон K-30, целлюлоза микрокристаллическая PH 102, магния стеарат, лактоза, изопропиловый спирт.

Состав оболочки: Opadry YS-1-7006 прозрачный, ариавит коричневый, опалюкс коричневый, вода.

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Мегадин это комбинация витаминов и минералов.

Витамин А (ретинол): это жирорастворимый витамин. При дефиците витамина А развиваются кератомаляция, ксерофтальмия и куриная слепота.

Витамин Е, благодаря своему антиоксидантному действию, защищает клетки от повреждения свободными радикалами.

Витамин С участвует в регенерации тканей, формировании коллагена.

Комплекс витаминов группы В участвует в превращении углеводов, белка и жиров.

Витамин D обеспечивает нормальное развитие костей и зубов, регулирует утилизацию кальция в организме.

Никотинамид и биотин участвует в различных биохимических реакциях.

Фосфат и кальций необходимы для минерализации костей.

Железо и медь участвуют в процессе кроветворения, цинк, молибден, магний и марганец являются необходимыми элементами.

Показания к применению:

— лечение дефицита витаминов и минералов в период реконвалесценции после длительных заболеваний, в пред- и послеоперационный период;

— при нарушениях всасывания, обусловленных заболеваниям ЖКТ.

Относится к болезням:

- Реконвалесценция

Противопоказания:

— гипервитаминоз А или D;

— гиперкальциемия или гиперкальциурия;

— беременность;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

По 1 таб./сут во время завтрака.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции. В высоких дозах и при длительном применении возможны такие реакции, как аллергическая сыпь и изъязвление слизистых.

Передозировка:

Необходимо подчеркнуть, что Мегадин, в рекомендуемых во вкладыше дозах, явлений передозировки или отравления не вызывает. Поскольку Мегадин содержит жирорастворимые витамины А и D, признаки острой или хронической передозировки могут развиться после однократного приема высокой дозы или при длительном применении.

Симптомы: признаки передозировки витамина А включают головную боль, головокружение, раздражительность, спутанность сознания, потерю аппетита, рвоту, диарею, сухость кожи и нарушения зрения. Главные признаки передозировки витамина D — тошнота, рвота, запор, головная боль, головокружение, сонливость, отложение кальция во внутренних органах (почках).

Лечение: при передозировке рекомендуется отменить данное лекарственное средство и провести симптоматическое лечение.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не применять одновременно с тетрациклинами из-за возможного нежелательного взаимодействия.

Если показан прием тетрациклинов в процессе применения Мегадина, интервал между приемом этих двух лекарственных средств должен составлять примерно 2 ч.

Особые указания и меры предосторожности:

Мегадин следует применять в рекомендуемых дозах. В высоких дозах Мегадин может вызвать гипервитаминоз.

Мегадин нельзя применять одновременно с другими лекарственными средствами, содержащими витамины и минералы без назначения врача.

Условия хранения:

Препарат хранить при температуре не выше 25°С, в сухом месте.. Хранить в местах, недоступных для детей. Не использовать после даты, указанной на упаковке.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Megadin