

Мегаплекс



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Прогестаген. Оказывает противоопухолевое действие, которое связывают с антилютеинизирующим эффектом, реализующимся через гипофиз, и действием на рецепторы стероидных гормонов.

Показания к применению:

Гормонозависимый рак молочной железы в поздних стадиях и его рецидивирующие формы у женщин в менопаузе (в качестве паллиативного лечения).

Рецидивирующий и/или метастатический рак эндометрия (в качестве дополнительного и/или паллиативного лечения).

Относится к болезням:

- [Рак](#)
- [Эндометрит](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к мегестролу.

Способ применения и дозы:

Устанавливают индивидуально, в зависимости от показаний и стадии заболевания, схемы противоопухолевой терапии.

Побочное действие:

Возможно: увеличение массы тела.

Мегаплекс

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Редко: тромбоз флебит, тромбоз эмболия легочной артерии, туннельный синдром запястья, алопеция, тошнота и рвота, отеки, прорывные маточные кровотечения, одышка, гиперемия в месте опухоли, гипергликемия, сыпь.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с аминокислотами возможно уменьшение концентрации мегестрола в плазме крови, по-видимому, вследствие индукции микросомальных ферментов печени.

Карбамазепин, гризеофульвин, фенобарбитал, фенитоин, рифампицин могут повышать клиренс прогестагенов.

Под влиянием прогестагенов возможно изменение эффективности гипогликемических препаратов.

Прогестагены могут ингибировать метаболизм циклоспорина, что приводит к увеличению его концентрации в плазме крови и повышению риска токсичности.

Особые указания и меры предосторожности:

Мегестрол не является заменой хирургического лечения, химио- или лучевой терапии.

Не используют в качестве теста на беременность.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Megapleks>