Мегаплекс



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Прогестаген. Оказывает противоопухолевое действие, которое связывают с антилютеинизирующим эффектом, реализующимся через гипофиз, и действием на рецепторы стероидных гормонов.

Показания к применению:

Гормонозависимый рак молочной железы в поздних стадиях и его рецидивирующие формы у женщин в менопаузе (в качестве паллиативного лечения).

Рецидивирующий и/или метастатический рак эндометрия (в качестве дополнительного и/или паллиативного лечения).

Относится к болезням:

- Рак
- Эндометрит

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к мегестролу.

Способ применения и дозы:

Устанавливают индивидуально, в зависимости от показаний и стадии заболевания, схемы противоопухолевой терапии.

Побочное действие:

Возможно: увеличение массы тела.

Редко: тромбофлебит, тромбоэмболия легочной артерии, туннельный синдром запястья, алопеция, тошнота и рвота, отеки, прорывные маточные кровотечения, одышка, гиперемия в месте опухоли, гипергликемия, сыпь.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с аминоглутетимидом возможно уменьшение концентрации мегестрола в плазме крови, по-видимому, вследствие индукции микросомальных ферментов печени.

Карбамазепин, гризеофульвин, фенобарбитал, фенитоин, рифампицин могут повышать клиренс прогестагенов.

Под влиянием прогестагенов возможно изменение эффективности гипогликемических препаратов.

Прогестагены могут ингибировать метаболизм циклоспорина, что приводит к увеличению его концентрации в плазме крови и повышению риска токсичности.

Особые указания и меры предосторожности:

Мегестрол не является заменой хирургического лечения, химио- или лучевой терапии.

Не используют в качестве теста на беременность.

Источник: http://drugs.thead.ru/Megapleks