# Мэлсмон




## Код АТХ:

- G02CX

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Гидролизат плаценты человека

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

Раствор для подкожного введения 2 мл по 50 ампул темного стекла в пачке картонной.

## Состав:

**Одна ампула раствора для подкожного введения содержит:**

*Активное вещество:* гидролизат плаценты человека 100 мг

*Вспомогательные вещества:* бензиловый спирт 30 мг/2 мл, натрия гидроксид до pH 6,8-7,0, вода д/и до 2 мл.

## Описание:

Раствор для п/к введения прозрачный или с слегкой опалесценцией, от светло-желтого до желтого с коричневым оттенком цвета, со специфическим запахом.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Механизм действия препарата точно не установлен. Достоверно установлено, что биологически активные вещества, содержащиеся в гидролизате плаценты человека, повышают активность клеточного и тканевого дыхания, положительно влияют на процессы метаболизма в клетках, обладают антиоксидантным действием и стимулируют регенерацию тканей; снижают утомляемость, активизирует процессы саморегуляции организма, способствуя повышению адаптационных механизмов в пременопаузальный и постменопаузальный периоды.

***Фармаконетика***

Препарат быстро всасывается после введения. Поскольку основными компонентами действующего вещества являются аминокислоты, они естественным образом включаются в нормальные метаболические процессы организма и не нуждаются в специальных путях экскреции.

## Показания к применению:

В составе комплексной терапии, для коррекции астенических состояний у женщин в пери- и постменопаузе, характеризующихся снижением внимания, работоспособности, чрезмерной возбудимостью и реактивностью.

## Относится к болезням:

- Астенические состояния

## Противопоказания:

Препарат не должен применяться при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже:

— гиперчувствительность к действующему веществу и/или другим компонентам препарата;

— нарушения функций эндокринных желез;

— артериальная гипертензия;

— беременность и период лактации;

— детский возраст.

*С осторожностью.* Рекомендуется назначать с осторожностью при почечной и/или печеночной недостаточности; при желчекаменной болезни, прогрессирующих заболеваниях сердечнососудистой системы; при сахарном диабете; ослабленным больным.

## Способ применения и дозы:

Препарат применяют подкожно, только под наблюдением врача.

В составе комплексной терапии у женщин в пери- и постменопаузе вводится по 2 мл препарата через день (3 ампулы в неделю), в течение 2 недель. При необходимости через 1-2 недели курс лечения можно повторить.

Введение препарата производится только путем подкожных инъекций! В/в введение препарата строго запрещено!

## Побочное действие:

*Аллергические реакции:* сыпь, зуд, аллергический дерматит, крапивница, жар, озноб, тошнота.

*Местные реакции:* болезненность, покраснение, чувство тепла в месте введения препарата.

*Другие:* боли в области молочной железы.

При появлении данных симптомов следует прекратить введение препарата и обратиться к врачу.

Если Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

## Передозировка:

Данных о передозировке Мэлсмон нет. При длительном применении препарата в высоких дозах возможно усиление описанных выше побочных эффектов.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Во избежание возможных лекарственных взаимодействий с препаратом Мэлсмон, применять другие препараты можно только после согласования с врачом. Не взаимодействует с препаратами, применяемыми в комплексной терапии у женщин в пери- и постменопаузе.

Сведения о каких-либо других клинически значимых взаимодействиях Мэлсмона до настоящего времени отсутствуют.

## Особые указания и меры предосторожности:

Женщинам в пери- и постменопаузе показан медицинский осмотр в индивидуальном порядке, но не реже 1 раза в 6 месяцев.

Применение препарата Мэлсмон не влияет на концентрацию внимания и быстроту психомоторных реакций, соответственно, не наказывает влияния на управление транспортными средствами, механизмами.

Рекомендуется назначать с осторожностью при печеночной и почечной недостаточности.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Melsmon