

Мемоплант



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гинкго двулопастного листьев экстракт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки, покрытые пленочной оболочкой** коричневатого-желтого цвета, гладкие, круглые.

	1 таб.
сухой стандартизированный экстракт листьев гинкго двулопастного (EGb 761) (35-67:1)*	40 мг,
в т.ч. флавоногликозиды	9.6 мг,
терпенлактоны	2.4 мг

Вспомогательные вещества: натрия кроскармеллоза, пеногасящая эмульсия SE2, кремния диоксид коллоидный, гипромеллоза, лактозы моногидрат, макрогол 1500, магния стеарат, крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая, тальк, титана диоксид (E171), железа оксид (E172).

- 10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
- 10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
- 10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.
- 15 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 15 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
- 15 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
- 15 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.
- 20 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 20 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
- 20 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
- 20 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.

◇ **Таблетки, покрытые пленочной оболочкой** коричневатого-желтого цвета, круглые, гладкие.

	1 таб.
сухой стандартизированный экстракт листьев гинкго	80 мг,

Мемоплант

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

двулопастного (EGb 761) (35-67:1)*	
в т.ч. гинкгофлавогликозиды	19.2 мг,
терпенлактоны	4.8 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, натрия кроскармеллоза, кремния диоксид коллоидный, целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, магния стеарат.

Состав оболочки: гипромеллоза, макрогол 1500, пеногасящая эмульсия SE2, тальк, титана диоксид (E171), железа оксид красный (E172), железа оксид коричневый (E172).

10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.
15 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
15 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
15 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
15 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.
20 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
20 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
20 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
20 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой коричневатого-красного цвета, круглые, двояковыпуклые; на изломе - от светло-желтого до коричневатого-желтого цвета.

	1 таб.
сухой стандартизированный экстракт листьев гинкго двулопастного (EGb 761) (35-67:1)*	120 мг,
в т.ч. гинкгофлавогликозиды	28.8 мг,
терпенлактоны	7.2 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, кремния диоксид коллоидный, целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, натрия кроскармеллоза, магния стеарат.

Состав оболочки: гипромеллоза, макрогол 1500, пеногасящая эмульсия SE2, тальк, титана диоксид (E171), железа оксид красный (E172).

10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.
15 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
15 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
15 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
15 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.
20 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
20 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
20 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
20 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.

* экстрагент: ацетон 60%.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат растительного происхождения. Повышает устойчивость организма к гипоксии, особенно тканей головного мозга. Тормозит развитие травматического или токсического отека головного мозга. Улучшает мозговое и периферическое кровообращение, улучшает реологию крови.

Оказывает дозозависимое регулирующее влияние на сосудистую систему, расширяет мелкие артерии, повышает тонус вен. Препятствует образованию свободных радикалов и перекисному окислению липидов клеточных мембран. Нормализует высвобождение, повторное поглощение и катаболизм нейромедиаторов (норэпинефрина, допамина, ацетилхолина) и их способность к соединению с рецепторами. Улучшает обмен веществ в органах и тканях, способствует накоплению в клетках макроэргов, повышению утилизации кислорода и глюкозы, нормализации медиаторных процессов в ЦНС.

Фармакокинетика

Действие препарата Мемоплант является совокупным действием компонентов экстракта листьев гинкго билоба, поэтому проведение кинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению:

- нарушения функций головного мозга, в т.ч. возрастные, связанные с нарушением мозгового кровообращения и сопровождающиеся следующими симптомами: ухудшение памяти, снижение способности к концентрации внимания и интеллектуальных способностей, головокружение, шум в ушах, головная боль;
- нарушения периферического кровообращения (облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей с такими характерными симптомами, как перемежающаяся хромота, онемение и похолодание стоп, болезнь Рейно);
- нарушения функции внутреннего уха, проявляющиеся головокружением, неустойчивой походкой и шумом в ушах.

Относится к болезням:

- [Головокружение](#)
- [Шум в ушах](#)

Противопоказания:

- снижение свертываемости крови;
- эрозивный гастрит;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;
- острые нарушения мозгового кровообращения;
- острый инфаркт миокарда;
- детский возраст до 12 лет (для таблеток 40 мг) (в связи с недостаточными данными);
- детский возраст до 18 лет (для таблеток 80 мг и 120 мг) (в связи с недостаточными данными);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Таблетки 40 мг

Для симптоматического лечения расстройств мозгового кровообращения назначают по 1-2 таб. (40-80 мг сухого стандартизированного экстракта листьев гинкго двулопастного EGb 761) 3 раза/сут. Курс лечения - не менее 8 недель.

При нарушениях периферического кровообращения назначают по 1 таб. (40 мг сухого стандартизированного экстракта листьев гинкго двулопастного EGb 761) 3 раза/сут или по 2 таб. (80 мг сухого стандартизированного экстракта листьев гинкго двулопастного EGb 761) 2 раза/сут. Курс лечения - не менее 6 недель.

При сосудистой или инволюционной патологии внутреннего уха назначают по 1 таб. (40 мг сухого стандартизированного экстракта листьев гинкго двулопастного EGb 761) 3 раза/сут или по 2 таб. (80 мг сухого стандартизированного экстракта листьев гинкго двулопастного EGb 761) 2 раза/сут. Курс лечения - 6-8 недель.

Таблетки 80 мг

Для симптоматического лечения расстройств мозгового кровообращения назначают по 1 таб. (80 мг сухого стандартизированного экстракта листьев гинкго двулопастного EGb 761) 2-3 раза/сут. Курс лечения - не менее 8 недель.

При нарушениях периферического кровообращения назначают по 1 таб. (80 мг сухого стандартизированного экстракта листьев гинкго двулопастного EGb 761) 2 раза/сут. Курс лечения - не менее 6 недель.

При сосудистой или инволюционной патологии внутреннего уха назначают по 1 таб. (80 мг сухого стандартизированного экстракта листьев гинкго двулопастного EGb 761) 2 раза/сут. Курс лечения - 6-8 недель.

Таблетки 120 мг

Назначают по 1 таблетке (120 мг сухого стандартизированного экстракта листьев гинкго двулопастного EGb 761) 1-2 раза/сут. Продолжительность курса лечения зависит от тяжести заболевания и должно продолжаться не менее 8 недель.

Мемоплант

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

В случае отсутствия результатов через 3 месяца лечения следует оценить целесообразность дальнейшего лечения.

Таблетки следует принимать не разжевывая, запивая небольшим количеством воды. Препарат принимают независимо от приема пищи.

В случае пропуска приема препарата или если было принято недостаточное его количество, то последующий прием следует проводить так, как указано в режиме дозирования, без каких-либо изменений.

Побочное действие:

Аллергические реакции: возможны покраснение, кожная сыпь, отечность кожи, зуд.

Со стороны ЦНС: редко - головная боль, головокружение, нарушение слуха.

Со стороны свертывающей системы крови: возможно снижение свертываемости крови; в единичных случаях - кровотечения, наблюдавшихся у пациентов, одновременно принимавших средства, снижающие свертываемость крови (связь данных кровотечений с приемом препаратов гинкго двулопастного EGb 761 не подтверждена).

Прочие: редко - желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея).

В случае развития побочных эффектов применение препарата следует прекратить и пациенту следует обратиться к врачу.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Мемоплант не сообщалось. Мемоплант обладает хорошей переносимостью.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В связи с отсутствием достаточных клинических данных не рекомендуется применять препарат Мемоплант при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется назначение препарата Мемоплант пациентам, постоянно принимающим ацетилсалициловую кислоту, антикоагулянты (прямого и непрямого действия), а также препараты, снижающие свертываемость крови.

Особые указания и меры предосторожности:

Пациент должен быть информирован о том, что при часто возникающих ощущениях головокружения и шума в ушах необходимо проконсультироваться с врачом. В случае внезапного ухудшения или потери слуха нужно незамедлительно обратиться к врачу.

В состав таблеток входит лактоза, поэтому препарат не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 12 лет (для таблеток 40 мг) в связи с недостаточными данными; в детском возрасте до 18 лет (для таблеток 80 мг и 120 мг) в связи с недостаточными данными.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С. Срок годности таблеток 40 мг и 80 мг - 5 лет, таблеток 120 мг - 3 года.

Мемоплант

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Memoplant>