

Менцевакс Асву



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Лиофилизат для приготовления раствора для п/к инъекций в виде аморфной массы или порошка белого цвета; приложенный растворитель - прозрачный, бесцветный; приготовленный раствор - прозрачный, бесцветный.

	0.5 мл (1 доза)
очищенные полисахариды <i>Neisseria meningitidis</i> серогруппы А	50 мкг
очищенные полисахариды <i>Neisseria meningitidis</i> серогруппы С	50 мкг
очищенные полисахариды <i>Neisseria meningitidis</i> серогруппы W ₁₃₅	50 мкг
очищенные полисахариды <i>Neisseria meningitidis</i> серогруппы Y	50 мкг

Вспомогательные вещества: лактоза (наполнитель).

Растворитель: 0.9% р-р натрия хлорида - 0.5 мл.

Вакцина соответствует требованиям ВОЗ к биологическим препаратам и к менингококковым полисахаридным вакцинам.

1 доза - флаконы стеклянные (1) в комплекте с растворителем (амп.) - коробки картонные.

1 доза - флаконы стеклянные (1) в комплекте с растворителем (фл.) - коробки картонные.

1 доза - флаконы стеклянные (1) в комплекте с растворителем (шприцы стеклянные) и иглами (1 или 2 шт.) - блистеры (1) - коробки картонные.

Лиофилизат для приготовления раствора для п/к инъекций в виде аморфной массы или порошка белого цвета; приложенный растворитель прозрачный, бесцветный или слегка розоватого цвета, со слабым запахом фенола; приготовленный раствор - прозрачный, бесцветный.

	0.5 мл (1 доза)
очищенные полисахариды <i>Neisseria meningitidis</i> серогруппы А	50 мкг
очищенные полисахариды <i>Neisseria meningitidis</i> серогруппы С	50 мкг
очищенные полисахариды <i>Neisseria meningitidis</i> серогруппы W ₁₃₅	50 мкг
очищенные полисахариды <i>Neisseria meningitidis</i> серогруппы Y	50 мкг

Вспомогательные вещества: лактоза (наполнитель).

Растворитель: 0.9% р-р натрия хлорида, содержащий фенол 0.25% (в качестве консерванта) - 5 мл.

Вакцина соответствует требованиям ВОЗ к биологическим препаратам и к менингококковым полисахаридным вакцинам.

10 доз - флаконы (1) в комплекте с растворителем (фл.) - коробки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп ACWY.

Однократное введение Менцевакс ACWY вызывает выработку бактерицидных антител против менингококков серогрупп А, С, W₁₃₅ и Y, которые персистируют в крови на протяжении 2 лет у 95% привитых.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике вакцины Менцевакс ACWY не предоставлены.

Показания к применению:

Активная иммунизация взрослых и детей в возрасте 2 лет и старше против менингококкового менингита, вызванного менингококками серогрупп А, С, W₁₃₅ и Y, в т.ч.:

- при высоком риске заражения (например, жители эндемичных районов или лица, посещающие такие районы);
- лицам, живущим в закрытых коллективах или же контактирующим с больными менингитом, вызванным менингококками серогрупп А, С, W₁₃₅ и Y (например, персонал инфекционных отделений больниц).

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)
- [Менингит](#)

Противопоказания:

- острое тяжелое заболевание, сопровождающееся повышением температуры тела;
- повышенная чувствительность к любому компоненту вакцины;
- реакция повышенной чувствительности на предшествовавшее введение полисахаридной менингококковой вакцины.

Способ применения и дозы:

Менцевакс ACWY вводят п/к однократно.

1 иммунизирующая доза = 0.5 мл растворенной вакцины.

Правила приготовления раствора для п/к инъекций

Вакцину перед применением растворяют прилагаемым растворителем из расчета 0.5 мл на одну дозу. Флакон тщательно встряхивают до полного растворения содержимого в течение 1 мин. Растворенный препарат представляет собой прозрачный бесцветный раствор. Если он выглядит иначе, а также при наличии посторонних частиц, вакцину не используют. После разведения лиофилизата растворителем вакцину следует использовать немедленно.

Допускается хранение раствора во флаконе, содержащем 10 доз, в холодильнике не более 8 ч. Раствор следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей.

Для введения препарата должна быть использована новая стерильная игла. При использовании вакцины в многодозовой упаковке для забора препарата каждый раз должны быть использованы новый шприц и игла. Растворенный препарат в многодозовой упаковке должен быть использован в течение рабочего дня. Препарат следует извлекать из флакона при строгом соблюдении правил асептики.

Вакцину Менцевакс ACWY ни при каких обстоятельствах нельзя вводить в/в.

Побочное действие:

Местные реакции: возможны эритема, легкое уплотнение, болезненность или боль в месте инъекции.

Системные реакции: крайне редко у вакцинированных лиц возникают головная боль, недомогание, сонливость, лихорадка, аллергические реакции, включая анафилактические реакции.

Передозировка:

Данные о передозировке вакцины Менцевакс АСWУ не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В настоящее время нет данных о применении вакцины Менцевакс АСWУ при беременности, а также данных о влиянии на репродуктивную систему лабораторных животных. Исходя из теоретических предпосылок, следует воздерживаться от введения вакцины Менцевакс АСWУ при беременности, кроме случаев, когда беременные женщины подвержены высокому риску заражения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Вакцину Менцевакс АСWУ можно вводить одновременно с другими вакцинами, при этом препараты должны быть введены разными шприцами в разные участки тела.

Вакцину Менцевакс АСWУ нельзя смешивать с другими вакцинами.

Особые указания и меры предосторожности:

Легкая инфекция не является противопоказанием для иммунизации.

Вакцина Менцевакс АСWУ не защищает от менингококкового менингита, вызванного менингококками, принадлежащими к другим серогруппам помимо А, С, W₁₃₅ и Y.

При введении лицам с нарушениями иммунитета вакцина может не вызывать эффективного иммунного ответа.

Как и при введении всех инъекционных вакцин, следует всегда иметь в наличии необходимое оборудование и препараты для лечения анафилактических реакций, которые могут возникнуть после введения Менцевакс АСWУ.

Вакцинируемые должны находиться под медицинским наблюдением в течение 30 мин после введения вакцины.

Условия хранения:

Вакцину в комплекте с растворителем хранят и транспортируют при температуре от 2° до 8°C. Растворитель в отдельных упаковках – при температуре от 2° до 25 °C. Замораживание не допускается. Срок годности вакцины - 2 года, растворителя - 5 лет.

Вакцину и растворитель следует хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Mencevaks_Acwy