Менопейс



Код АТХ:

- A11AA04

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Минералы
- Поливитамины

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капсулы*** твердые желатиновые, размер №0, темно-зеленого цвета, с белым логотипом Vitabiotics на крышке капсулы и Monopace - на корпусе; содержимое капсул - гранулированный порошок желтоватого цвета.

	1 капс.
ретинол (в форме ацетата)	2500 МЕ (750 мкг)
колекальциферол	100 МЕ (2.5 мкг)
токоферол (в форме D-α-токоферола ацетата)	30 мг
тиамин (в форме мононитрата)	10 мг
рибофлавин	5 мг
пиридоксин (в форме хлорида)	40 мг
цианокобаламин	9 мкг
фолиевая кислота	400 мкг
биотин	30 мкг
ниацин	20 мг
аскорбиновая кислота	45 мкг
пантотеновая кислота (в форме кальция пантотената)	30 мг
пара-аминобензойная кислота	30 мг
железо (в форме фумарата)	12 мг
цинк (в форме сульфата моногидрата)	15 мг
магний (в форме оксида)	100 мг
марганец (в форме сульфата моногидрата)	2 мг
йод (в форме калия йодида)	225 мкг
медь (в форме сульфата моногидрата)	1 мг
хром	50 мкг
селен (в форме натрия селената)	100 мкг
бор (в форме натрия бората)	2 мг

Состав оболочки: желатин, титана диоксид, комплекс меди с хлорофиллом, вода очищенная.

15 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики
- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

[I] - Инструкция по медицинскому применению одобрена фармакологическим комитетом МЗ РФ

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав витаминами и минеральными веществами.

Пантотеновая кислота поддерживает продукцию эстрогенов надпочечниками во время менопаузы и в сочетании с витаминами B_1, B_2, B_6 усиливает эффекты эстрадиола.

Витамины С, B_6, B_3, B_4, цинк, магний участвуют в синтезе гамма-линолевой кислоты (предшественника простагландина Е, участвующего в регуляции гормонального баланса и ослабляющего симптомы менопаузы).

Витамин Е улучшает теплорегуляцию, уменьшает распад прогестерона, в сочетании с витамином С ослабляет ощущение учащенного сердцебиения, утомляемость, нервозность, с парааминобензойной и пантотеновой кислотами - повышенную раздражительность, с витамином B_6 и магнием - тревожность и депрессию.

Витамины B_{12}, B_1, B_3, фолиевая кислота нормализуют нервную деятельность.

Хром, магний, цинк в сочетании с витаминами С, B_6, B_3 контролируют уровень глюкозы, снижают колебания настроения, бессонницу.

Витамины Е, С, А и цинк поддерживают нормальное состояние слизистой оболочки влагалища, предотвращают ее сухость.

Витамин D способствует абсорбции кальция, в сочетании с бором поддерживает положительный кальциевый баланс у женщин в климактерическом периоде, препятствуя развитию остеопороза.

Йод участвует в регуляции метаболизма жиров.

Витамины А, С, Е, комплекс витаминов группы В, селен, медь, железо - обладают антиоксидантной активностью, необходимы для поддержания нормального состояния иммунной системы, профилактики ишемической болезни сердца.

Фармакокинетика

Всасывание

Менопейс активно всасывается из ЖКТ сразу же после приема.

Метаболизм

Основные компоненты препарата метаболизируются в печени.

Распределение

Компоненты Менопейса распределяются в тканях организма и обнаруживаются в печени (витамин А, B_{12}, фолиевая кислота, магний), жировой ткани (витамины D, E), мышцах (витамин D, цинк), костях (цинк), мозге (магниий), почках (магний), поджелудочной железе (магний), эритроцитах, селезенке, сердце, ногтях.

Выведение

Компоненты Менопейса и их метаболиты выделяются из организма с желчью (витамины Е, B_{12}, магний), фекалиями (кальция пантотенат, цинк, магний), мочой (витамины Е, А, С, Н, B_6, B_{12}, фолиевая кислота, никотинамид, кальция пантотенат, цинк, магнии, йод, кремний) как в неизмененном виде, так и в виде метаболитов.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии.

— специфичный для менопаузы симптомокомплекс — "приливы", повышенное потоотделение, вагинальная сухость, эмоциональная лабильность, головные боли, нарушение сна, беспокойство, вазомоторные нарушения.

Относится к болезням:

- Вагинит

Противопоказания:

— гиперчувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Внутрь, 1 капс. в день во время или после еды, запивать стаканом воды или холодным напитком.

Побочное действие:

Возможны: аллергические реакции на компоненты препарата.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте.

Срок годности — 3 г. Не использовать после срока, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Menopeys