

Меновазин



Код АТХ:

- [M02AX10](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бензокаин](#)
- [Прокаин](#)
- [Рацементол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Раствор спиртовой для наружного применения 25, 40, 50 мл - флаконы стеклянные (1, 108, 120) - пачки картонные/коробки.

Состав:

100 мл спиртового раствора содержат

Активные вещества: ментол 2,5 г, прокаин 1 г, бензокаин 1 г

Вспомогательное вещество: этанол 70%.

Описание:

Раствор спиртовой для наружного применения прозрачный, бесцветный, с запахом ментола.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Рацементол (ментол) при нанесении на кожу вызывает раздражение нервных окончаний и расширение поверхностных сосудов кожи и ощущение прохлады, сопровождающееся анальгезирующим (обезболивающим) эффектом и облегчением кожного зуда.

Прокаин (новокаин) - местноанестезирующее средство с умеренной анестезирующей активностью. Блокирует натриевые каналы, препятствует генерации импульсов в окончаниях чувствительных нервов и проведению импульсов по нервным волокнам. Бензокаин (анестезин) - местноанестезирующее средство для поверхностной анестезии. Препятствует возникновению болевых импульсов в окончаниях чувствительных нервов и их проведению по нервным волокнам.

Ментол усиливает местноанестезирующее действие прокаина (новокаина) и бензокаина (анестезина) при их одновременном применении в составе комбинированного препарата.

Фармакокинетика

При наружном применении компоненты препарата практически не поступают в системный кровоток.

Показания к применению:

Препарат рекомендован к применению при следующих состояниях:

- невралгия, миалгия, артралгия (как местноанестезирующее средство);
- зудящие дерматозы (как противозудное средство).

Относится к болезням:

- [Артралгия](#)
- [Дерматит](#)
- [Миалгия](#)
- [Невралгия](#)

Противопоказания:

Препарат рекомендован к применению при следующих состояниях:

- гиперчувствительность;
- нарушение целостности кожных покровов;
- воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения.

С осторожностью: беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет.

Перед началом применения препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Способ применения и дозы:

Наружно. Наносят на пораженные участки кожи или на кожу над пораженной областью и растирают 2-3 раза в день. Курс лечения продолжают в зависимости от терапевтического эффекта, но не более 3-4 недель. При необходимости курс повторяют.

Побочное действие:

Меновазин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Аллергические реакции: контактный дерматит.

При длительном применении: головокружение, астения, снижение артериального давления (в этом случае лечение прекращают).

Если при применении препарата появляются любые из указанных в инструкции побочных эффектов, или они усугубляются необходимо сообщить об этом врачу.

Передозировка:

Симптомы: головокружение, общую слабость, понижение артериального давления.

Лечение: необходимо смыть остатки препарата с поверхности кожи водой.

В этих случаях препарат отменяют, проводят симптоматическое лечение.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата в период беременности возможно только по назначению врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с препаратами для наружного использования, которые содержат местно анестезирующие средства, усиливает эффекты этих препаратов.

Особые указания и меры предосторожности:

Эффективность и безопасность применения препарата у пациентов моложе 18 лет не установлена.

Препарат не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного концентрированного внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения:

Препарат хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 15°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Menovazin>