

Ментолатум Балм



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Мазь для наружного применения	100 г
камфора	9 г
левоментол	1.35 г
метилсалицилат	330 мг
скипидар живичный	80 мг
масло эвкалиптовое	80 мг

30 г - банки (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, обладает местнораздражающим (отвлекающим), противовоспалительным, антисептическим действием.

При наружном применении ментол оказывает местнораздражающее, местное обезболивающее и антисептическое действие, камфора - местнораздражающее и антисептическое действие.

Метилсалицилат обладает противовоспалительным эффектом, способствует снижению болевых ощущений после всасывания через кожу.

Показания к применению:

В качестве симптоматического средства в комплексной терапии:

— воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем;

— мышечной боли, включая боль в пояснице при ишиалгии, люмбаго, боли ревматического характера, боли при ушибах.

Относится к болезням:

- [Ишиалгия](#)
- [Люмбаго](#)

- [Ревматизм](#)
- [Ушиб](#)

Противопоказания:

- бронхиальная астма, провоцируемая приемом ацетилсалициловой кислоты или другими НПВП;
- повреждения кожных покровов;
- наличие кожных заболеваний на участках предполагаемого нанесения препарата;
- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно.

Мазь применяется у **взрослых и детей старше 3 лет** (при отсутствии других рекомендаций врача) 2-3 раза/сут.

При *воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем* препарат наносят на неповрежденную кожу грудной клетки, шеи и спины и растирают.

При *мышечной боли, включая боль в пояснице при ишиалгии, люмбаго, боли ревматического характера, боли при ушибах* препарат наносят на болезненную область и втирают мягкими массажными движениями. Продолжительность лечения определяется врачом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, бронхоспазм.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно по назначению врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Метилсалицилат усиливает эффект антикоагулянтов, метотрексата при абсорбции, что следует учитывать при применении препарата.

Особые указания и меры предосторожности:

Использовать только для наружного применения.

Не наносить на чувствительные участки кожи, в т.ч. в области лица (особенно носа). В случае попадания мази на чувствительные участки немедленно смойте препарат большим количеством чистой воды.

Следует избегать контакта препарата с глазами. При попадании на слизистую оболочку глаза, мазь следует смыть большим количеством теплой воды.

В случае случайного проглатывания препарата следует обратиться к врачу.

После применения препарата Ментолатум Балм следует тщательно мыть руки, если они не являются объектом для лечения.

Ментолатум Балм

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Место нанесения мази не укрывайте или только слегка прикройте.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 3 лет.

Мазь применяется у **детей старше 3 лет** (при отсутствии других рекомендаций врача) 2-3 раза/сут.

Условия хранения:

Препарат хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Mentolatum_Balm