Ментолатум Балм



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Мазь для наружного применения***	**100 г**
камфора	9 г
левоментол	1.35 г
метилсалицилат	330 мг
скипидар живичный	80 мг
масло эвкалиптовое	80 мг

30 г - банки (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, обладает местнораздражающим (отвлекающим), противовоспалительным, антисептическим действием.

При наружном применении ментол оказывает местнораздражающее, местное обезболивающее и антисептическое действие, камфора - местнораздражающее и антисептическое действие.

Метилсалицилат обладает противовоспалительным эффектом, способствует снижению болевых ощущений после всасывания через кожу.

Показания к применению:

В качестве симптоматического средства в комплексной терапии:

— воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем;

— мышечной боли, включая боль в пояснице при ишиалгии, люмбаго, боли ревматического характера, боли при ушибах.

Относится к болезням:

- Ишиалгия
- Люмбаго

- Ревматизм
- Ушиб

Противопоказания:

— бронхиальная астма, провоцируемая приемом ацетилсалициловой кислоты или другими НПВП;

— повреждения кожных покровов;

— наличие кожных заболеваний на участках предполагаемого нанесения препарата;

— детский возраст до 3 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно.

Мазь применяется у **взрослых и детей старше 3 лет** (при отсутствии других рекомендаций врача) 2-3 раза/сут.

При *воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем* препарат наносят на неповрежденную кожу грудной клетки, шеи и спины и растирают.

При *мышечной боли, включая боль в пояснице при ишиалгии, люмбаго, боли ревматического характера, боли при ушибах* препарат наносят на болезненную область и втирают мягкими массажными движениями. Продолжительность лечения определяется врачом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, бронхоспазм.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно по назначению врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Метилсалицилат усиливает эффект антикоагулянтов, метотрексата при абсорбции, что следует учитывать при применении препарата.

Особые указания и меры предосторожности:

Использовать только для наружного применения.

Не наносить на чувствительные участки кожи, в т.ч. в области лица (особенно носа). В случае попадания мази на чувствительные участки немедленно смойте препарат большим количеством чистой воды.

Следует избегать контакта препарата с глазами. При попадании на слизистую оболочку глаза, мазь следует смыть большим количеством теплой воды.

В случае случайного проглатывания препарата следует обратиться к врачу.

После применения препарата Ментолатум Балм следует тщательно мыть руки, если они не являются объектом для лечения.

Место нанесения мази не укрывайте или только слегка прикройте.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 3 лет.

Мазь применяется у **детей старше 3 лет** (при отсутствии других рекомендаций врача) 2-3 раза/сут.

Условия хранения:

Препарат хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Mentolatum_Balm