# Мепивастезин



## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Мепивакаин

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Местноанестезирующее средство, механизм действия которого связан со стабилизацией клеточных мембран. Вызывает все виды местной анестезии: терминальную, инфильтрационную, проводниковую. Оказывает быстрое и сильное действие.

## Показания к применению:

Для местной анестезии при различных терапевтических и хирургических вмешательствах в полости рта (смазывание слизистых оболочек при интубации трахеи, бронхоэзофагоскопии, тонзиллэктомии; в стоматологии).

## Относится к болезням:

- Анестезия
- Бронхит
- Стоматит
- Тонзиллит
- Трахеит

## Противопоказания:

Повышенная чувствительность к местноанестезирующим средствам амидного типа и к алкил-4-гидроксибензоатам (парабенам).

## Способ применения и дозы:

Количество раствора и общая доза зависят от вида анестезии и характера оперативного вмешательства или манипуляций. Средняя разовая доза - 1.3 мл; при необходимости доза может быть увеличена.

*Максимальные суточные дозы:* для взрослых и детей с массой тела более 30 кг - 5.4 мл; для детей с массой тела 20-30 кг - 3.6 мл; для детей с массой тела менее 20 кг - 1.8 мл.

## Побочное действие:

*Возможно:* (особенно при превышении дозы или при случайном внутрисосудистом введении) эйфория, депрессия, нарушения речи, глотания, зрения, судороги, угнетение дыхания, кома, брадикардия, артериальная гипотензия; аллергические реакции (крапивница, отек Квинке).

## Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности применение мепивакаина возможно только по строгим показаниям.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении мепивакаина с бета-адреноблокаторами, блокаторами кальциевых каналов и другими противоаритмическими средствами усиливается угнетающее действие на проводимость и сократимость миокарда.

## Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью применяют у пациентов пожилого возраста.

***Применение в пожилом возрасте***

С осторожностью применяют у пациентов пожилого возраста.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Mepivastezin