Метандростенолона таблетки 0,005 г



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Метандиенон

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Таблетки	**1 таб.**
метандиенон	5 мг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Анаболический стероид. Стимулирует синтез белка в организме, улучшает трофику тканей, способствует отложению кальция в костях. Вызывает задержку в организме азота, фосфора, серы, калия, натрия, воды.

Показания к применению:

Нарушения синтеза белка, кахексии различного генеза. После травм, ожогов, в до- и послеоперационных периодах, после облучения и инфекционных заболеваний. При недостаточности функции почек и надпочечников, токсическом зобе, мышечной дистрофии, остеопорозе, а также отрицательном балансе азота, связанном с кортикостероидной терапией, гипо- и апластические анемии.

В составе комплексной терапии при туберкулезе, остеомиелите, бронхиальной астме, гепатите.

Относится к болезням:

- Баланит

- Бронхит
- Гепатит
- Гепатоз
- Зоб
- Инфекции
- Кахексия
- Остеомиелит
- Остеопороз
- Травмы
- Туберкулез

Противопоказания:

Рак предстательной железы, рак грудных желез у мужчин, острый и хронический простатит. Беременность и лактация. Острая печеночная недостаточность.

Способ применения и дозы:

Взрослым - 10-20 мг/сут. Поддерживающая доза - 5-10 мг/сут.

Детям от 5 до 14 лет - по 5 мг/сут ежедневно или через день.

Побочное действие:

Возможно: диспептические симптомы, преходящая желтуха, отеки, огрубление голоса, гинекомастия (преимущественно у больных с циррозом печени).

У женщин - нарушения менструального цикла, вирилизация, усиление либидо, увеличение печени.

У детей - преждевременное окостенение, вирилизация.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Диагнозы

- Артриты
- Боли в грудной клетке
- Головная боль
- Горная болезнь

Особые указания и меры предосторожности:

Детям и подросткам после 4-недельного курса целесообразно сделать перерыв 1-2 месяца.

Источник: http://drugs.thead.ru/Metandrostenolona_tabletki_0005_g_0