Метеоспазмил

Код АТХ:

- A03AX58

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Симетикон

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капсулы*** светло-желтого цвета, мягкие, продолговатые, блестящие, размер 6; содержимое капсул - густая суспензия белого цвета.

	1 капс.
альверина цитрат	60 мг
симетикон	300 мг

Вспомогательные вещества: лецитин соевый, триглицериды средней плотности.

Состав оболочки капсулы: желатин, глицерол, титана диоксид, вода очищенная.

10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат. Оказывает спазмолитическое действие, уменьшает газообразование в кишечнике.

Альверин - миотропный спазмолитик, действие которого не сопровождается атропиноподобным эффектом или ганглиоблокирующей активностью. Снижает повышенный тонус гладкой мускулатуры кишечника.

Симетикон - гидрофобное полимерное вещество с низким поверхностным натяжением, снижающее газообразование в кишечнике и покрывающее защитной пленкой стенки ЖКТ.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Метеоспазмил не предоставлены.

Показания к применению:

— функциональные расстройства ЖКТ, проявляющиеся болями в животе, повышенным газообразованием, отрыжкой, тошнотой, запорами, диареей или их чередованием;

— подготовка к рентгенологическому, ультразвуковому или инструментальному исследованию органов брюшной полости.

Относится к болезням:

- Диарея
- Запор
- Отрыжка
- Тошнота

Противопоказания:

— детский возраст до 14 лет;

— индивидуальная непереносимость альверина цитрата и других компонентов препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь по 1 капс. 2-3 раза/сут перед едой.

При *подготовке к исследованиям органов брюшной полости* препарат назначают по 1 капс. 2-3 раза/сут накануне исследования и 1 капс. утром в день исследования.

Побочное действие:

Аллергические реакции: редко - крапивница (исчезает при прекращении лечения), отек гортани, шок.

Со стороны пищеварительной системы: редко - нарушения функции печени (исчезают при прекращении лечения).

Передозировка:

Лечение: при необходимости - проведение симптоматической терапии под контролем врача.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Метеоспазмил не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 14 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Meteospazmil