

Метилурацил (таблетки)



Код АТХ:

- [L03AX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Диоксометилтетрагидропиримидин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки белого цвета, круглые, плоскоцилиндрической формы, с фаской и риской.

	1 таб.
диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил)	500 мг

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный 130 мг, кальция стеарат 7 мг, повидон К30 49 мг, тальк 14 мг.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Гематотропные средства](#)
- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Обладает анаболической активностью. Оказывает гемопоэтическое, лейкопоэтическое, иммуностимулирующее, противовоспалительное действие. Нормализует нуклеиновый обмен, ускоряет процессы регенерации в ранах, ускоряя рост и грануляционное созревание ткани и эпителизацию (в том числе в быстропролиферирующих клетках слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта), стимулирует эритро- и лейкопоз, клеточные и гуморальные факторы иммунитета.

Показания к применению:

Лейкопения (легкие формы, в том числе возникшие в результате химиотерапии злокачественных новообразований, при рентгено- и лучевой терапии), агранулоцитарная ангина, алиментарно-токсическая алейкия, анемия,

Метилурацил (таблетки)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

тромбоцитопения, интоксикация бензолом, лучевая болезнь, реконвалесценция (после тяжелых инфекций), язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (в составе комбинированной терапии), вялIZAживающие раны, ожоги, переломы костей, гепатит, панкреатит.

Относится к болезням:

- [Агранулоцитоз](#)
- [Аденоиды \(гипертрофия глоточной миндалины\)](#)
- [Ангина](#)
- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Интоксикация](#)
- [Инфекции](#)
- [Панкреатит](#)
- [Раны](#)
- [Реконвалесценция](#)
- [Тромбоз](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

Противопоказания:

Гиперчувствительность, лейкоз (лейкемические формы, особенно миелоидные), лимфогранулематоз, гемобластозы, злокачественные новообразования костного мозга, детский возраст - до 3 лет.

Способ применения и дозы:

Внутрь, во время или после еды.

Взрослым - по 500 мг 4 раза в сут. (при необходимости - до 6 раз в сут., максимальная суточная доза - 3 г);

Детям от 3 до 8 лет - по 250 мг 3 раза в сут. (максимальная суточная доза - 750 мг);

Детям от 8 лет до 14 лет - по 250-500 мг 3 раза в сут. (максимальная суточная доза - 1.5 г).

Курс при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта - 30-40 дней; в других случаях может быть менее продолжительным.

Побочное действие:

Аллергические реакции, головная боль, головокружение, изжога.

Передозировка:

При клиническом применении случаев передозировки до этого времени не зарегистрировано.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В период беременности и в период лактации следует соотнести предполагаемую пользу для матери и потенциальный риск для плода и ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает противолучевое действие цистамина.

Особые указания и меры предосторожности:

Метилурацил (таблетки)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте - до 3 лет.

Условия хранения:

Препарат хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 5 лет. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Metiluracil_tabletki