

Метопролол (раствор)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

[Метопролол \(раствор\)](#)



Код АТХ:

- [C07AB02](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Метопролол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Раствор для в/в введения в виде прозрачной, бесцветной жидкости.

| | |
|-------------------------------|-------------|
| | 1 мл |
| метопролол (в форме тартрата) | 1 мг |

Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 9 мг, вода д/и - до 1 мл.

5 мл - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

5 мл - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

5 мл - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные (20) - коробки картонные (для стационаров).

5 мл - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные (50) - коробки картонные (для стационаров).

5 мл - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные (100) - коробки картонные (для стационаров).

Фармакотерапевтическая группа:

- [Вегетотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — антиаритмическое, антиангинальное, гипотензивное.

Способ применения и дозы:

Внутрь, с едой или сразу после еды, не разжевывая и запивая жидкостью.

Артериальная гипертензия: начальная суточная доза составляет 50–100 мг в 1–2 приема (утром и вечером). При недостаточном терапевтическом эффекте суточная доза может быть постепенно повышена до 100–200 мг и/или дополнительно назначены другие антигипертензивные средства.

Метопролол (раствор)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Максимальная суточная доза — 200 мг.

Стенокардия, аритмии, профилактика приступов мигрени: 100–200 мг в сутки в два приема (утром и вечером).

Вторичная профилактика инфаркта миокарда: 200 мг в сутки в два приема (утром и вечером).

Функциональные нарушения сердечной деятельности, сопровождающиеся тахикардией: 100 мг в сутки в два приема (утром и вечером).

У пожилых больных, при нарушениях функции почек, а также при необходимости проведения гемодиализа дозу не изменяют.

При нарушениях функции печени дозу препарата следует снизить в зависимости от клинического состояния.

Источник: http://drugs.thead.ru/Metoprolol_rastvor