

[Мидрум](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Тропикамид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Раствор-капли глазные 0.5%** прозрачные, бесцветные, без запаха, свободные от механических примесей.

	1 мл
тропикамид	5 мг

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, натрия моногидрофосфата додекагидрат, натрия дигидрофосфата дигидрат, вода д/и.

10 мл - флаконы полиэтиленовые (1) с капельницей - коробки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

М-холиноблокатор. Вследствие блокады м-холинорецепторов радужки и цилиарного тела вызывает кратковременный мидриаз и паралич аккомодации. Незначительно повышает внутриглазное давление.

Мидриаз развивается через 5-10 мин и достигает максимума к 20-45 минутам. Максимальное расширение зрачка сохраняется 1 ч. Через 6 ч происходит возвращение диаметра зрачка к первоначальному размеру.

Показания к применению:

- для диагностических целей при проведении офтальмоскопии и определение рефракции с помощью скиаскопии;
- повышенная чувствительность к другим препаратам, расширяющим зрачок;
- для профилактики развития синехий в составе комплексной терапии воспалительных заболеваний глаз.

Противопоказания:

- глаукома (особенно закрытоугольная);

- офтальмотонус;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Для *диагностического расширения зрачка* закапывают 1-3 капли в течение 10 мин. При трехразовом закапывании через 10 мин можно проводить офтальмоскопию.

Для *определения рефракции* Мидрум закапывают по 1 капле 6 раз с интервалом 6-12 мин.

При применении в *лечебных целях* Мидрум следует закапывать по 1 капле до 6 раз/сут.

Побочное действие:

Со стороны органа зрения: снижение остроты зрения, фотофобия, повышение ВГД, аллергические реакции.

Системные реакции: головная боль, психотические реакции, тахикардия, снижение АД, судороги, сухость во рту, дизурия, гипертермия.

Передозировка:

Лечение: при случайном попадании препарата внутрь рекомендуется прием активированного угля и промывание желудка; при необходимости - симптоматическая терапия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью назначают Мидрум при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении адреномиметики могут усилить, а м-холиномиметики ослабить эффект тропикамида.

При одновременном применении трициклические антидепрессанты, фенотиазины, амантадин, хинидин, блокаторы гистаминовых H₁-рецепторов повышают вероятность развития побочных эффектов.

Особые указания и меры предосторожности:

Для уменьшения вероятности системной абсорбции препарата рекомендуется слегка надавить пальцем на область слезного мешка в течение 2-3 мин после закапывания.

Во время лечения глазными каплями Мидрум ношение мягких контактных линз противопоказано.

Использование в педиатрии

С осторожностью назначают препарат **грудным детям**.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Во время лечения следует соблюдать осторожность при занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и скорости психомоторных реакций.

Применение в детском возрасте

С осторожностью назначают препарат **грудным детям**.

Мидрум

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.
После вскрытия флакона срок хранения - 6 недель.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Midrum>