Микодерил



Код АТХ:

- D01AE22

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Нафтифин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru

Форма выпуска:

Раствор для наружного применения, 1 %. По 10 мл, 20 мл во флаконы-капельницы из темного (янтарного) стекла, укупоренные полиэтиленовыми пробками-капельницами и полиэтиленовыми крышками с контролем первого вскрытия.Каждый флакон-капельницу помещают в пачку из картона.

Крем для наружного применения, 1 %. По 10 г, 15 г, 20 г, 25 г, 30 г, 40 г, 50 г или 100 г в алюминиевые тубы.Тубу помещают в пачку из картона.

Состав:

Раствор для наружного применения (на 1 мл)	
активное вещество:	
нафтифина гидрохлорид	10 мг
вспомогательные вещества: пропиленгликоль — 50 мг; этанол (этиловый спирт 95%) — 400 мг; вода очищенная — до 1 мл	

Крем для наружного применения (на 1 г)	
активное вещество:	
нафтифина гидрохлорид	10 мг
вспомогательные вещества: натрия гидроксид — 1,2 мг; бензиловый спирт — 10 мг; сорбитана стеарат — 19 мг; цетилпальмитат — 20 мг; полисорбат 60 — 61 мг; цетостеариловый спирт — 80 мг; изопропилмиристат — 80 мг; вода очищенная — до 1000 мг	

Описание:

Раствор: прозрачный, бесцветный или слегка желтоватый, с запахом этанола.

Крем: белый однородный, со слабым специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противогрибковое.

Фармакодинамика

Раствор для наружного применения, 1%

Крем для наружного применения, 1%

Микодерил, раствор и крем для наружного применения, 1% — противогрибковые средства, предназначенные для наружного применения, относящиеся к классу аллиламинов. Их активным ингредиентом является нафтифин.

Механизм действия связан с ингибированием сквален-2,3-эпоксидазы, что приводит к снижению образования эргостерола, входящего в состав клеточной стенки гриба. Нафтифин, влияя на сквалеиэпоксидазу, не затрагивает систему цитохрома Р-450.

Нафтифин активен в отношении дерматофитов, таких как *Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum*, дрожжевых и дрожжеподобных грибов *(Candida spp., Pityrosporum)*, плесневых грибов *(Aspergillus)* и других грибов (например *Sporothrix schenckii*). В отношении дерматофитов и аспергилл нафтифин действует фунгицидно. В отношении дрожжевых грибов препарат проявляет фунгицидную или фунгистатическую активность в зависимости от штамма микроорганизма.

Нафтифин обладает антибактериальной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, вызывающих вторичные бактериальные инфекции.

Нафтифин обладает противовоспалительным действием, которое способствует быстрому исчезновению симптомов воспаления, особенно зуда.

Показания к применению:

Онихомикозы, отрубевидный лишай, эпидермофитии крупных кожных складок и стоп, рубромикоз, трихофития, микроспория, кандидозы кожи, микозы со вторичной бактериальной инфекцией.

Относится к болезням:

- Инфекции
- Лишай
- Микоз
- Отрубевидный лишай
- Эпидермофития

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к нафтифину.

Способ применения и дозы:

Диагнозы

- Атопический дерматит
- Бородавки
- Витилиго
- Выпадение волос

Побочное действие:

В *отдельных случаях:* в месте нанесения сухость и покраснение кожи, чувство жжения.

Передозировка:

О случаях передозировки не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности в рекомендованных дозах не оказывает неблагоприятного действия на плод.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не отмечено взаимодействие с другими лекарственными препаратами.

Особые указания и меры предосторожности:

Общие для обеих лекарственных форм

Требуется курсовое лечение.

Препарат Микодерил не предназначен для применения в офтальмологии.

Следует избегать попадания препарата в глаза и на открытые раны.

Использование в педиатрии: с осторожностью следует применять препарат у детей до 18 лет (эффективность и безопасность препарата не доказана).

Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами. Не оказывает отрицательное влияние на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Источник: http://drugs.thead.ru/Mikoderil