

## [Микофенолата Мофетил-ТЛ \(капсулы\)](#)



### **Код АТХ:**

- [L04AA06](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Микофенолата мофетил](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр<sup>МНН</sup>](#) [Википедия<sup>МНН</sup>](#)  
[РЛС VITAL](#) [Mail.Ru Drugs.com<sup>англ</sup>](#)

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Иммунотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Иммунодепрессивное средство; морфолиноэтиловый эфир микофеноловой кислоты, продуцируемой *Penicillium stoloniferum*. Нарушает синтез гуанозиновых нуклеотидов, ингибируя инозинмонофосфатдегидрогеназу. Угнетает пролиферацию Т- и В-лимфоцитов, а также продукцию антител.

### **Показания к применению:**

Профилактика острого отторжения органа и лечение рефрактерного к терапии отторжения органа у больных после аллогенной пересадки почки.

Профилактика острого отторжения органа и с целью улучшения выживаемости трансплантата и выживаемости пациентов после аллогенной пересадки сердца.

Профилактика острого отторжения органа у больных после аллогенной пересадки печени.

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к микофенолату мофетилу.

## **Способ применения и дозы:**

Применяют в составе комбинированной терапии с циклоспорином и ГКС. Для предупреждения реакции отторжения трансплантата первую дозу микофенолата мофетила принимают в течение первых 3 сут после операции. При приеме внутрь рекомендуемая доза составляет 2 г/сут, частота приема - 2 раза/сут.

Для лечения реакции отторжения - 3 г/сут.

## **Побочное действие:**

*Со стороны системы кроветворения:* лейкопения, тромбоцитопения, анемия.

*Со стороны мочевыделительной системы:* некроз почечных канальцев, гематурия, альбуминурия, дизурические явления, гиперурикемия.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* артериальная гипертензия или гипотензия, аритмии, нарушения коронарного кровообращения.

*Со стороны обмена веществ:* гипер- или гипокалиемия, гипофосфатемия, гипер- или гипокальциемия, гиперволемия, ацидоз.

*Со стороны пищеварительной системы:* гингивит, гиперплазия десен, язвенный стоматит, тошнота, рвота, боли в животе, запор или диарея, эзофагит, гастрит, гастроэнтерит, проктит, гепатит.

*Со стороны ЦНС и периферической нервной системы:* головокружение, трепет, нарушения сна, беспокойство, депрессия, сонливость, парестезии, конъюнктивит, амблиопия, катаракта.

*Со стороны эндокринной системы:* гипергликемия вплоть до развития сахарного диабета, гиперхолестеринемия, гипопротеинемия, увеличение массы тела, нарушение функции паращитовидных желез.

*Со стороны костно-мышечной системы:* миалгии, артриты, судороги мышц ног.

*Со стороны дыхательной системы:* кашель, одышка, фарингит, синусит, бронхоспазм.

*Дermatologические реакции:* гирсутизм, алопеция, зуд, акне, изъязвление кожи, злокачественные новообразования кожи.

В связи с иммунодепрессивным действием возможно развитие инфекционных поражений разных органов, включая инфекции нижних отделов мочевыводящих путей, кандидоз слизистых оболочек ЖКТ, герпетическая и цитомегаловирусная инфекция, аспергиллез.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Не рекомендуется одновременное применение с азатиоприном.

В процессе лечения необходим регулярный контроль состояния крови. При уменьшении количества нейтрофилов до 1300/мкл следует снизить дозу микофенолата мофетила или отменить его.

У больных, принимающих микофенолат мофетил, повышен риск возникновения лимфом и других злокачественных опухолей, в частности, рака кожи.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Mikofenolata\\_Mofetil-TL\\_kapsuly](http://drugs.thead.ru/Mikofenolata_Mofetil-TL_kapsuly)