

[Микогал](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Омоконазол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Крем для наружного применения 1% белого цвета, однородный, без запаха.

	1 г
омоконазола нитрат микронизированный	10 мг

Вспомогательные вещества: парафин сверхжидкий, полисорбат 40, карбомер 934Р, бензойная кислота, натрия гидроксид (30% водный раствор), лабрафил М-2130-CS (макрогола и глицеридов пальмового масла эфиры), вода дистиллированная.

20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Активное вещество - нитрат омоконазола является производным имидазола, обладает противогрибковым и антибактериальными свойствами.

Механизм действия основывается на блокировании биосинтеза эргостерола и изменении липидного состава грибов.

Действует фунгистатически в отношении дрожжевых грибов (*Candida albicans*, *Candida glabrata* и других видов *Candida*), дерматофитов (*Trichophyton* spp., *Epidermophyton* spp., *Microsporum* spp.), *Pityrosporum orbiculare*, *Pityrosporum ovale*, *Aspergillus* spp. Согласно исследованиям *in vitro*, омоконазол оказывает бактерицидное действие против грамположительных бактерий.

Фармакокинетика

При наружном применении не всасывается или всасывается в очень малой степени.

Показания к применению:

- местное лечение грибковых заболеваний кожи;
- кандидоз;

Микогал

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

— заболевания кожи и волос, вызванные дерматофитами: дерматофитии кистей и стоп, гладкой кожи, паховая дерматофития, дерматофитии волосистой части головы и области бороды;

— отрубевидный лишай;

— себорейный дерматит, вызванный *Pityrosporum ovale*;

— эритразма.

Относится к болезням:

- [Дерматит](#)
- [Дерматофития](#)
- [Лишай](#)
- [Отрубевидный лишай](#)
- [Себорея](#)
- [Эритразма](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* при беременности и в период лактации.

Способ применения и дозы:

Наружно.

Крем наносится на пораженный участок кожи 1-2 раза/сут тонким слоем и слегка втирается.

В зависимости от характера грибкового заболевания средний курс лечения составляет 2-6 недель. Лечение следует продолжить еще в течение недели после полного излечения (исчезновение симптомов воспаления, субъективных жалоб) с целью предотвращения рецидивов заболевания.

Побочное действие:

Препарат хорошо переносится. В отдельных случаях может ощущаться локальное жжение или слабое раздражение кожи. В большинстве случаев данные симптомы являются временными и не требуют прекращения лечения.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Исследования на животных показали, что в терапевтических дозах омоконазол не оказывает эмбриотоксического действия.

Применение препарата Микогал при беременности возможно только в тех случаях, когда потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода. При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Неизвестно.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью следует применять на больших участках поврежденной кожи, при лечении детей в возрасте до 5 лет. Не рекомендуется применять у больных, чувствительных к бензойной кислоте.

Не следует наносить на слизистые оболочки и кожу в области глаз.

Микогал

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Для мытья тела следует пользоваться нейтральным или слабощелочным мылом. В период лечения нижнее белье, полотенце и губку для мытья следует дезинфицировать и менять ежедневно.

Условия хранения:

Хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15°C до 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Mikogal>