

## Микокет



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Мазь для наружного применения 2%** белого или белого с кремовым или розоватым оттенком цвета.

	<b>100 г</b>
кетоконазол	2 г

*Вспомогательные вещества:* метилпарагидроксibenзоат (метилпарабен или нипагин) - 200 мг, пропиленгликоль - 10 г, глицерол (глицерин дистиллированный) - 10 г, вазелин (вазелин медицинский) - 15 г, эмульгатор №1 - 8 г, вода (вода очищенная) - до 100 г.

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Кетоконазол - противогрибковое средство широкого спектра действия, синтетическое производное имидазола (имидазол-диоксолана). Оказывает фунгицидное или фунгистатическое действие.

Препарат *активен в отношении* дерматофитов *Trichophyton* spp. (в т.ч. *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*), *Microsporum* spp. (в т.ч. *Microsporum canis*), *Epidermophyton floccosum*, дрожжеподобных грибов рода *Candida* spp. (в т.ч. *Candida albicans*), *Pityrosporum* spp. (в т.ч. *Pityrosporum ovale*, *Pityrosporum orbiculare*, *Malassezia furfur*).

Кетоконазол *активен также в отношении* *Staphylococcus* spp. и *Streptococcus* spp.

Механизм действия кетоконазола заключается в ингибировании биосинтеза эргостерола, триглицеридов и фосфолипидов, необходимых для синтеза клеточной стенки грибов, что приводит к нарушению проницаемости клеточной стенки грибов, к потере способности грибов к образованию нитей и колоний.

Мазь Микокет очень быстро воздействует на зуд при дерматофитных и дрожжевых инфекциях, в т.ч. при поражениях кожи, вызванных *Pityrosporum* spp.. При этом симптоматическое улучшение наблюдается еще до появления первых признаков выздоровления.

#### Фармакокинетика

При наружном применении кетоконазол не всасывается в системный кровоток, при длительном применении мази концентрация кетоконазола в крови не определяется.

## Показания к применению:

Лечение микозов кожи, вызванных чувствительными к препарату грибами:

- дерматомикоз гладкой кожи;
- паховая эпидермофития;
- эпидермофития кистей и стоп;
- кандидоз кожи;
- отрубевидный (разноцветный) лишай;
- себорейный дерматит, вызванный *Pityrosporum ovale*.

## Относится к болезням:

- [Дерматит](#)
- [Кандидоз кожи](#)
- [Лишай](#)
- [Микоз](#)
- [Себорея](#)
- [Эпидермофития](#)

## Противопоказания:

- повышенная чувствительность к кетоконазолу или любому из вспомогательных компонентов препарата.

## Способ применения и дозы:

*Дерматомикоз гладкой кожи, паховая эпидермофития, эпидермофития кистей и стоп, кандидоз кожи, отрубевидный (разноцветный) лишай:* наносить мазь 1 раз/сут на пораженную кожу и непосредственно прилегающую к ней область.

*Себорейный дерматит:* мазь наносится на пораженную область 1-2 раза/сут в зависимости от тяжести поражения.

Следует продолжать лечение в течение достаточного промежутка времени, по крайней мере, в течение нескольких дней после исчезновения всех симптомов заболевания. Диагноз следует пересмотреть, если не отмечается клинического улучшения после 4-х недель лечения.

Обычная продолжительность лечения следующая: дерматомикоз гладкой кожи - 3-4 недели, эпидермофития стоп - 4-6 недель, паховая эпидермофития - 2-4 недели, кандидоз кожи - 2-3 недели, отрубевидный лишай - 2-3 недели. Общая продолжительность лечения себорейного дерматита - 2-4 недели. Для поддерживающей терапии при себорейном дерматите мазь наносится 1 или 2 раза в неделю.

## Побочное действие:

Редко - 1/10 000 назначений (> 0.01% и < 0.1%).

*Со стороны кожных покровов:* редко - раздражение и ощущение жжения; местные кожные проявления аллергического характера (такие как контактный дерматит), вызываемые активным компонентом мази - кетоконазолом или одним из вспомогательных компонентов - пропиленгликолем.

## Передозировка:

Использование мази в чрезмерных количествах может привести к эритеме, отеку и ощущению жжения, которые обычно исчезают после прекращения терапии.

При случайном приеме мази внутрь следует провести промывание желудка. Проводят симптоматическую терапию.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение при беременности и в период грудного вскармливания не противопоказано, т.к. при наружном применении кетоконазол не всасывается в системный кровоток.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Лекарственное взаимодействие кетоконазола не описано.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Только для наружного применения.

Мазь нельзя применять в офтальмологической практике. Следует избегать попадания в глаза.

Следует соблюдать общие меры гигиены для контроля за источниками инфекции и реинфекции.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, механизмами и занятию другими опасными видами деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от 15° до 20°C.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Mikoket>