# Миконорм



## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

◊ ***Крем для наружного применения 1%*** белый или почти белый, однородный, гомогенный.

| | **1 г** |
|---|---|
| тербинафина гидрохлорид | 10 мг |

*Вспомогательные вещества:* цетомакрогол 1000, цетостеариловый спирт, парафин жидкий легкий, парафин белый мягкий, пропиленгликоль, кремофор EL (макрогола глицерилрицинолеат), натрия гидрофосфата дигидрат, троламин, бензиловый спирт, вода очищенная.

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

[I] - Инструкция по медицинскому применению одобрена фармакологическим комитетом МЗ РФ

Противогрибковый препарат для местного применения, обладающий широким спектром противогрибковой активности. В небольших концентрациях тербинафин оказывает фунгицидное действие в отношении дерматофитов (Trichophyton rubrum, T.mentagrophytes, T.verrucosum, T.violaceum, T.tonsurans, Microsporum canis, Epidermophyton floccosum), плесневых (в основном C.albicans) и некоторых диморфных грибов (Pityrosporum orbiculare). Активность в отношении дрожжевых грибов, в зависимости от их вида, может быть фунгицидной или фунгистатической.

Тербинафин специфическим образом изменяет ранний этап биосинтеза стеролов, происходящего в грибах. Это ведет к дефициту эргостерола и к внутриклеточному накоплению сквалена, что вызывает гибель клетки гриба. Действие тербинафина осуществляется путем ингибирования фермента скваленэпоксидазы, расположенного на клеточной мембране гриба.

Тербинафин не оказывает влияния на систему цитохрома Р450 у человека и, соответственно, на метаболизм гормонов или других лекарственных препаратов.

***Фармакокинетика***

При наружном применении абсорбция - менее 5%, оказывает незначительное системное действие.

## Показания к применению:

— профилактика и лечение грибковых инфекций кожи, в т.ч. микозов стоп ("грибок" стопы), паховой эпидермофитии

(tinea cruris), грибковых поражений гладкой кожи тела (tineacorporis), вызванных такими дерматофитами как Trichophyton (в т.ч. T.rubrum, T.mentagrophytes, T.verrucosum, T.violaceum), Microsporum canis и Epidermophyton floccosum;

— дрожжевые инфекции кожи, в основном те, которые вызываются родом Candida (например, Candida albicans), в частности - опрелость;

— разноцветный лишай (Pityriasis versicolor), вызываемый Pityrosporum orbiculare (также известный под названием Malassezia furfur).

## Относится к болезням:

- Дерматит
- Дерматофития
- Инфекции
- Лишай
- Разноцветный лишай
- Эпидермофития

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к тербинафину или к любому из неактивных ингредиентов, входящих в состав препарата.

С *осторожностью*: печеночная и/или почечная недостаточность, алкоголизм, угнетение костномозгового кроветворения, опухоли, болезни обмена веществ, окклюзионные заболевания сосудов конечностей, детский возраст до 12 лет (отсутствие достаточного клинического опыта).

## Способ применения и дозы:

Наружно.

**Взрослые и дети с 12 лет:** перед нанесением крема необходимо очистить и подсушить пораженные участки. Крем наносят 1-2 раза/сут тонким слоем на пораженную кожу и прилегающие участки и слегка втирают. При *инфекциях, сопровождающихся опрелостью* (под молочными железами, в межпальцевых промежутках, между ягодицами, в паховой области), места нанесения крема можно прикрывать марлей, особенно на ночь.

Средняя продолжительность лечения:

*дерматомикоз туловища, голеней:* 1 неделя 1 раз/сут;

*дерматомикоз стоп:* 1 неделя 1 раз/сут;

*кандидоз кожи:* 1-2 недели 1 или 2 раза/сут;

*разноцветный лишай*: 2 недели 1 или 2 раза/сут.

Уменьшение выраженности клинических проявлений обычно отмечается в первые дни лечения. В случае нерегулярного лечения или преждевременного его прекращения существует риск возобновления инфекции. В случае, если через одну—две недели лечения не отмечается признаков улучшения, следует провести верификацию диагноза.

Режим дозирования Миконорма крема у **лиц пожилого возраста** не отличается от вышеописанного.

Не рекомендуется применение Миконорма у **детей в возрасте до 12 лет**.

## Побочное действие:

В местах нанесения препарата может появиться покраснение, ощущение зуда или жжения.

Аллергические реакции.

## Передозировка:

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Если же случайно Миконорм крем будет принят внутрь, можно ожидать развития таких же побочных явлений, как и при передозировке таблеток тербинафина (головная боль, тошнота, боли в эпигастрии и головокружение).

*Лечение*: активированный уголь, при необходимости - симптоматическая поддерживающая терапия.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

В экспериментальных исследованиях тератогенных свойств тербинафина выявлено не было. До настоящего времени не сообщалось о каких-либо пороках развития при применении Миконорма. Однако поскольку клинический опыт применения тербинафина у беременных женщин ограничен, его следует применять только по строгим показаниям.

Тербинафин выделяется с грудным молоком. Однако в случае применения кормящей матерью Миконорма крема через кожу всасывается небольшое количество активного вещества, поэтому неблагоприятное воздействие на младенца маловероятно.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Какие-либо лекарственные взаимодействия для Миконорма крема не известны.

## Особые указания и меры предосторожности:

Уменьшение выраженности клинических проявлений обычно отмечается в первые дни лечения. В случае нерегулярного лечения или преждевременного его прекращения имеется риск рецидива инфекции.

Миконорм крем предназначен только для наружного применения. Следует избегать попадания его в глаза, так как он может вызвать раздражение. При случайном попадании препарата в глаза, их следует немедленно промыть проточной водой, а в случае развития стойких явлений раздражения необходимо проконсультироваться с врачом. При развитии аллергических реакций необходимо отменить препарат.

***При нарушениях функции почек***

С осторожностью: почечная недостаточность.

***При нарушениях функции печени***

С осторожностью: печеночная недостаточность.

***Применение в пожилом возрасте***

Режим дозирования Миконорма крема у **лиц пожилого возраста** не отличается от вышеописанного.

***Применение в детском возрасте***

Не рекомендуется применение данного препарата у детей до 12 лет.

## Условия хранения:

Хранить при температуре от 5 до 25°С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 2 г . Не использовать после истечения срока годности.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Mikonorm