

## Микосептин



### Код АТХ:

- [D01AE04](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Ундециленат цинка](#)
- [Ундециленовая кислота](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Мазь для наружного применения** трехфазная, суспензионно-эмульсионного типа, от почти белого до белого со светло-желтоватым оттенком цвета, маслянистой консистенции, с характерным запахом, с мелкими жировыми зернами.

	<b>1 г</b>
ундециленовая кислота	50 мг
цинковая соль ундециленовой кислоты	200 мг

*Вспомогательные вещества:* парафин твердый, парафин жидкий, парафин твердый (точка плавления 64-68°C), вазелин белый, стеариновая кислота, воск вазелин, метилпарабен, моноглицериды свиного сала (димодан), олеомакрогол (словапол), вода очищенная.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Ундециленовая кислота и ее соли оказывают выраженное фунгистатическое действие в отношении дерматофитов рода *Trichophyton*, *Epidermophyton*, *Microsporum*.

Цинк, входящий в состав препарата, оказывает вяжущее действие, снижая, таким образом, проявления признаков раздражения кожных покровов, способствуя более быстрому заживлению.

## Показания к применению:

— лечение и профилактика грибковых заболеваний кожных покровов, вызванных чувствительными к препарату грибами.

## Относится к болезням:

- [Грибковые заболевания](#)

## Противопоказания:

— детский возраст (до 2 лет);

— повышенная чувствительность к ундециленовой кислоте и ее производным, парабенам, к другим компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Для наружного применения.

Наносить на чистую, сухую поверхность пораженной кожи 2 раза/сут. Продолжительность курса лечения 4-6 недель. После исчезновения клинических проявлений заболевания, для предотвращения рецидива рекомендуется наносить мазь 1 раз/сут в течение недели и далее, через день или 2 раза в неделю в течение одного месяца, сокращение курса лечения повышает риск рецидива заболевания.

## Побочное действие:

Возможны реакции повышенной чувствительности к компонентам препарата в виде покраснения, зуда кожных покровов, отека, чувства жжения, кожной сыпи.

При появлении признаков повышенной чувствительности применение препарата следует прекратить и сообщить об этом врачу.

## Передозировка:

Случаи передозировки не описаны. При случайном приеме препарата внутрь возможно появление тошноты и рвоты. Необходимо промыть желудок и обратиться к врачу, при необходимости проводят симптоматическое лечение.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможность применения препарата Микосептин во время беременности и кормления грудью определяется врачом индивидуально.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данных о взаимодействии препарата Микосептин с другими лекарственными средствами не получено. Возможность одновременного использования других лекарственных средств для наружного применения определяется врачом.

## Особые указания и меры предосторожности:

Препарат Микосептин нельзя наносить на открытую раневую поверхность, поврежденную поверхность кожных покровов, периорбитальную зону, следует избегать попадания мази в глаза.

### **Применение в детском возрасте**

Препарат противопоказан детям до 2 лет.

**Условия хранения:**

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

**Срок годности:**

3 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Mikoseptin>