

Микозидин



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Мазь для наружного применения 3%	100 г
метоксикарбонилхлорбензилидентиазолидиндион	3 г

30 г - банки темного стекла (1) - пачки картонные.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Микозидин - противогрибковое средство, оказывает фунгицидное действие в отношении дерматофитов (*Microsporum canis*, *Trichophyton gyrseum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton rubrum*) и дрожжей (*Candida spp.*). Препарат оказывает антибактериальное действие в отношении: *Bacillus cereus*, *Fusobacterium nucleatum*, *Micrococcus spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus pyogenes*.

Фармакокинетика

Микозидин после аппликации умеренно всасывается в системный кровоток, достигая C_{max} спустя 4 ч. Выводится с мочой и калом в течение первых сут.

Показания к применению:

— заболевания кожи, вызванные чувствительными к препарату грибами дерматофитами *Microsporum canis*, *Trichophyton gyrseum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton rubrum* и дрожжевыми грибами рода *Candida spp.*.

Относится к болезням:

- [Дерматит](#)
- [Дерматофития](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

- тяжелые заболевания печени и почек;
- детский возраст до 18 лет;
- беременность и период лактации.

Способ применения и дозы:

Наружно.

Мазь наносят на поражённые участки кожи тонким слоем, слегка втирая 1 раз в сут вечером. Максимальная суточная доза не должна превышать 5 г мази. Продолжительность лечения до разрешения клинических проявлений составляет от 2 до 8 недель.

Побочное действие:

Возможны местные реакции в виде жжения, зуда и покраснения кожи. В случае появления побочных реакций следует прекратить лечение.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано использовать данный препарат в период беременности и лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует избегать попадания препарата в глаза.

При нарушениях функции почек

Противопоказано при тяжелых заболеваниях функции почек.

При нарушениях функции печени

Противопоказано при тяжелых заболеваниях функции печени.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищённом от света месте, при температуре не выше 15°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Mikozidin>