## **Микозидин**



### Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

Мазь для наружного применения 3%	100 г
метоксикарбонилхлорбензилидентиазолидиндион	βг

<sup>30</sup> г - банки темного стекла (1) - пачки картонные.

# Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Микозидин - противогрибковое средство, оказывает фунгицидное действие в отношении дерматофитов (Microsporum canis, Trichophyton gyrseum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum) и дрожжей (Candida spp.). Препарат оказывает антибактериальное действие в отношении: Bacillus cereus, Fusobacterium nucleatum, Micrococcus spp., Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes.

#### Фармакокинетика

Микозидин после аппликации умеренно всасывается в системный кровоток, достигая  $C_{\text{max}}$  спустя 4 ч. Выводится с мочой и калом в течение первых сут.

## Показания к применению:

— заболевания кожи, вызванные чувствительными к препарату грибами дерматофитами Microsporum canis, Trichophyton gyrseum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum и дрожжевыми грибами рода Candida spp..

### Относится к болезням:

- Дерматит
- Дерматофития

### Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

<sup>30</sup> г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологическая база данных (http://drugs.thead.ru)

- тяжелые заболевания печени и почек;
- детский возраст до 18 лет;
- беременность и период лактации.

# Способ применения и дозы:

Наружно.

Мазь наносят на поражённые участки кожи тонким слоем, слегка втирая 1 раз в сут вечером. Максимальная суточная доза не должна превышать 5 г мази. Продолжительность лечения до разрешения клинических проявлений составляет от 2 до 8 недель.

### Побочное действие:

Возможны местные реакции в виде жжения, зуда и покраснения кожи. В случае появления побочных реакций следует прекратить лечение.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано использовать данный препарат в период беременности и лактации.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описано.

## Особые указания и меры предосторожности:

Следует избегать попадания препарата в глаза.

### При нарушениях функции почек

Противопоказано при тяжелых заболеваниях функции почек.

#### При нарушениях функции печени

Противопоказано при тяжелых заболеваниях функции печени.

### Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищённом от света месте, при температуре не выше  $15^{\circ}$ С. Хранить в недоступном для детей месте.

### Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Mikozidin