

Микозолон



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Мазипредон](#)
- [Миконазол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [МНН](#) [Википедия](#)^{МНН} [МНН](#)
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Мазь для наружного применения гомогенная, белого или почти белого цвета, со слабым характерным запахом.

	1 г
мазипредона гидрохлорид	2.5 мг
миконазол	20 мг

Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат, полисорбат 60, парафин жидкий, пропиленгликоль, цетостеариловый спирт, вода очищенная.

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывающий противовоспалительное, десенсибилизирующее, противозудное, противогрибковое и антибактериальное действие.

Мазипредон - водорастворимое производное преднизолона, оказывает противовоспалительное, десенсибилизирующее и противозудное действие.

Миконазол оказывает противогрибковое действие в отношении дерматофитов, кандид и антибактериальное действие преимущественно в отношении грамположительных бактерий.

Фармакокинетика

При местном применении всасывание миконазола незначительное: практически все количество миконазола находится на коже в неизменном виде. Менее 0.5% выделяется почками. Мазипредон при нанесении на кожные покровы всасывается медленно.

Показания к применению:

— грибковые заболевания кожи, вызываемые дерматофитами и кандидами, сопровождающиеся воспалением и

зудом;

- дерматозы, осложненные грамположительной бактериальной инфекцией;
- микозы с локализацией в области складок, в т.ч. межпальцевые, паховые, подмышечные;
- микозы слухового прохода;
- дерматиты, осложненные грибковой и бактериальной инфекцией.

Относится к болезням:

- [Воспаление](#)
- [Дерматит](#)
- [Дерматофития](#)
- [Зуд](#)
- [Инфекции](#)
- [Микоз](#)

Противопоказания:

- туберкулез кожи;
- вирусные заболевания кожи и слизистых оболочек (герпетическая инфекция, ветряная оспа);
- детский возраст до 2 лет.
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

При *кожных инфекциях*: на пораженные участки кожи Микозолон наносят тонким слоем 2 раза/сут до полного клинического выздоровления.

При *ногтевых инфекциях*: после удаления пораженных сегментов ногтей применяют препарат в виде окклюзионной повязки. Лечение продолжается без перерыва до полной регенерации ногтей.

При *инфекциях уха*: в наружный слуховой проход вводят турунды, пропитанные препаратом, 2 раза/сут. Лечение продолжается до полного выздоровления.

Курс лечения - в среднем 2-5 недель.

Побочное действие:

Побочные эффекты возникают очень редко. При повышенной чувствительности возможно: местное раздражение кожи, чувство жжения, покраснение кожи. При чувствительности к изоконазолу, тиоконазолу, оксиконазолу может возникать перекрестная аллергия.

При длительном применении препарата возможны атрофия кожи и стрии.

В случае длительного применения на обширной поверхности у детей в связи с соотношением площади поверхности кожи и массы тела, а также недостаточной чувствительности эпидермиса, возможно всасывание пропорционально большего количества глюкокортикостероида при местном применении и, соответственно, проявление системного действия.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о безопасности и эффективности применения препарата при беременности и в период грудного

Микозолон

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

вскармливания не предоставлены. Назначение Микозолона в эти период возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При применении Микозолона в период лактации необходимо решить вопрос об отмене грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описаны.

Особые указания и меры предосторожности:

В процессе лечения особое внимание следует уделять соблюдению правил личной гигиены и ухода за кожей. При повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата возможно раздражение кожи и атрофии. При отсутствии признаков улучшения после нескольких недель лечения необходимо прекратить прием препарата и подобрать другое лечение. При длительном применении препарата на большой поверхности кожи, а также в местах, где увеличена возможность всасывания (окклюзионная повязка, складки кожи), требуется особая осторожность.

Препарат не влияет на способность к вождению автотранспорта и выполнение работы, связанным с повышенным риском.

При нарушениях функции почек

Нет данных о применении препарата у пациентов с нарушением функции почек.

При нарушениях функции печени

Нет данных о применении препарата у пациентов с нарушением функции печени.

Применение в пожилом возрасте

Нет данных о применении препарата у пациентов пожилого возраста.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан к применению у детей в возрасте до 2 лет.

Условия хранения:

Условия хранения:

При температуре 8-15 °С в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Не использовать после срока, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Mikozolon>