

[Микозорал \(мазь\)](#)



Код АТХ:

- [D01AC08](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Кетоконазол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Мазь для наружного применения 2%** от белого до белого с кремоватым или розоватым оттенком цвета, со слабым специфическим запахом.

| | |
|--------------|------------|
| | 1 г |
| кетокконазол | 20 мг |

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, кармеллоза натрия, масло касторовое, моноглицериды дистиллированные, эмульгирующий воск, нипагин (метилпарагидроксибензоат), дибунол (бутилгидрокситолуол), вода очищенная.

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Кетоконазол - синтетическое производное имидазолдиаксолана, обладающее фунгицидным или микостатическим действием. Активен в отношении дерматофитов: *Trichophyton* spp., *Microsporum* spp., *Epidermophyton floccosum*, грибов рода *Candida*, а также в отношении стафилококков и стрептококков. Особенно эффективен в отношении *Pityrosporum* spp. Механизм действия заключается в ингибировании биосинтеза эргостерола и изменении липидного состава мембраны грибов.

Симптоматическое улучшение наблюдается очень быстро, еще до появления признаков выздоровления.

При длительном местном применении мази кетоконазол в крови не определяется/

Показания к применению:

Местное лечение микозов, вызванных чувствительными к препарату грибами:

- дерматомироз гладкой кожи;
- паховая эпидермофития;
- эпидермофития кистей и стоп, кандидоз кожи;
- отрубевидный лишай;
- себорейный дерматит, вызванный *Pityrosporum ovale*.

Относится к болезням:

- [Дерматит](#)
- [Кандидоз кожи](#)
- [Лишай](#)
- [Микоз](#)
- [Отрубевидный лишай](#)
- [Себорея](#)
- [Эпидермофития](#)

Противопоказания:

- нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого нанесения мази;
- повышенная чувствительность к кетоконазолу.

Способ применения и дозы:

При *дерматомикозе гладкой кожи* (паховой эпидермофитии, эпидермофитии кистей и стоп, кандидозе кожи и отрубевидном лишае) мазь наносят на пораженную и непосредственно прилегающую к ней область 1 раз в сутки.

При *себорейном дерматите* мазь наносят на пораженную область 1-2 раза в сутки, в зависимости от тяжести поражения.

Средняя продолжительность лечения составляет: при дерматомикозе гладкой кожи - 3-4 недели, при паховой эпидермофитии - 2-4 недели, при эпидермофитии стоп - 4-6 недель, при инфекциях, вызванных дрожжеподобными грибами - 2-3 недели, при отрубевидном лишае - 2-3 недели, при себорейном дерматите - 2-4 недели.

Следует продолжать лечение в течение, по крайней мере, нескольких дней после исчезновения симптомов заболевания. Если клиническое улучшение не отмечено после 4 недель лечения, то требуется уточнить диагноз.

Побочное действие:

При местном применении мази Микозорал возможны местные аллергические реакции в виде жжения, крапивницы и кожной сыпи. В редких случаях возникает контактный дерматит.

Передозировка:

Поскольку препарат предназначен только для наружного применения и практически не всасывается в системный кровоток, развитие симптомов передозировки маловероятно. При случайном приеме мази внутрь специальных мер не требуется.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Учитывая, что кетоконазол практически не всасывается в системный кровоток при наружном применении, возможно его использование при беременности и в период лактации.

Однако, перед применением мази Микозорал в этих случаях следует проконсультироваться с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Микозорал при наружном применении не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат предназначен только для наружного применения.

Мазь не применяют в офтальмологической практике. Следует избегать попадания мази в глаза.

Во время лечения следует соблюдать общие правила гигиены.

Условия хранения:

В сухом месте, при температуре не выше 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Mikozoral_maz