

Микролакс



Код АТХ:

- [A06AG11](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Раствор для ректального введения** бесцветный, опалесцирующий, вязкий.

	1 мл
натрия цитрат	90 мг
натрия лаурилсульфоацетат 70%	12.9 мг,
что соответствует содержанию натрия лаурилсульфоацетата	9 мг
раствор сорбитола 70%	893 мг,
что соответствует содержанию сорбитола	625 мг

Вспомогательные вещества: сорбиновая кислота - 1 мг, глицерол - 125 мг, вода очищенная - до 1 мл.

5 мл - микроклизмы для однократного применения (полиэтиленовые тубики с наконечником и отламывающейся пломбой) (4) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный слабительный препарат. Натрия цитрат - пептизатор, который вытесняет связанную воду, содержащуюся в каловых массах. Натрия лаурилсульфоацетат разжижает содержимое кишечника. Сорбит усиливает

Микролакс

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

слабительное действие за счет стимуляции поступления воды в кишечник. Увеличение количества воды за счет пептизации и разжижения способствует размягчению каловых масс и облегчает процесс опорожнения кишечника.

Слабительный эффект наступает через 5-15 мин после приема препарата.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Микролакс не предоставлены.

Показания к применению:

- запор (в т.ч. с энкопрезом);
- подготовка к эндоскопическому (ректоскопия) и рентгенологическому исследованию ЖКТ.

Относится к болезням:

- [Запор](#)

Противопоказания:

- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют ректально.

Взрослым и детям в возрасте старше 3 лет следует вводить содержимое 1 микроклизмы (5 мл), вставляя наконечник на всю длину.

Новорожденным и детям в возрасте до 3 лет наконечник следует вводить на половину длины (см. отметку на наконечнике).

Пациент должен быть предупрежден о том, что если жалобы сохраняются в течение длительного времени, то необходимо обратиться к врачу.

Указания по применению препарата

1. Отломить пломбу на наконечнике тюбика.
2. Слегка надавить на тюбик так, чтобы капля препарата смазала кончик клизмы (для облегчения процесса введения).
3. Ввести наконечник микроклизмы на всю длину (детям в возрасте до 3 лет - на половину длины) в прямую кишку.
4. Сдавливая тюбик, выдавить полностью его содержимое.
5. Извлечь наконечник, продолжая слегка сдавливать тюбик.

Побочное действие:

Местные реакции: легкое ощущение жжения в ректальной области.

В отдельных случаях: реакции повышенной чувствительности.

Передозировка:

В настоящее время случаи передозировки не описаны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При необходимости применения при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не требуется специальных мер предосторожности.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Микролакс не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Пациент должен быть информирован о том, что если лекарственное средство пришло в негодность или истек срок годности, то не следует выбрасывать его в сточные воды или на улицу. Необходимо поместить лекарственное средство в пакет и положить в мусорный контейнер. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Микролакс не оказывает влияние на способность к управлению транспортными средствами и управлению механизмами.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Mikrolaks>