Микстура От Кашля Для Детей Сухая

Код АТХ:

- R05CA10

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Алтея лекарственного корней экстракт
- Аммония хлорид
- Аниса обыкновенного семян масло
- Натрия бензоат
- Натрия гидрокарбонат
- Солодки корней экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] [мнн] [мнн] [мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] [мнн] [мнн] [мнн] [мнн]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Порошок для приготовления раствора для приема внутрь***	**1 бут.**
экстракт алтея лекарственного	4 г
масло анисовое	50 мг
натрия гидрокарбонат	2 г
сухой экстракт корней солодки голой	1 г

19.55 г - бутылки стеклянные вместимостью 200 мл (1) - пачки картонные.
1,47 г - пакетики бумажные ламинированные (5) - пачки картонные.
1,47 г - пакетики бумажные ламинированные (10) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает отхаркивающее, противокашлевое и противовоспалительное действие.

Натрия гидрокарбонат сдвигает pH бронхиальной слизи в щелочную сторону, снижает вязкость мокроты; корень солодки, анисовое масло оказывают против-воспалительное и спазмолитическое действие; натрия бензоат и аммония хлорид оказывают отхаркивающее действие.

Способствует удалению слизи из дыхательных путей при кашле.

Показания к применению:

— в качестве отхаркивающего средства при заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (в т.ч. трахеит, бронхит, бронхопневмония).

Относится к болезням:

- Бронхит
- Бронхопневмония
- Трахеит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата,

— острый гломерулонефрит;

— острый пиелонефрит;

— беременность;

— период грудного вскармливания;

— дефицит сахаразы/изомальтазы;

— непереносимость фруктозы;

— глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Способ применения и дозы:

Внутрь, **детям:** содержимое 1 пакета растворить в 15 мл (1 столовая ложка) охлажденной кипяченой воды. Принимать внутрь 3-4 раза в день после еды:

детям до года - по 15-20 капель;

детям 1-2 лет - по 40 капель;

детям 3-4 лет - по 1/2 чанной ложки (2,5 мл);

детям 5-6 лет - по 2/3 чанной ложки (3,75 мл);

детям 7-8 лет - по 1 чайной ложке (5 мл);

детям 9-12 лет - по 2 чайных ложки (10 мл);

детям старше 12 лет - по 1 столовой ложке (15 мл).

Курс лечения 2-3 недели.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, тошнота, рвота, диарея; может оказывать раздражающее действие на слизистую оболочку желудка.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано при беременности и лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, снижающими образование мокроты.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакции.

Указания для больных сахарным диабетом: содержание углеводов в разовой дозе препарата соответствует 0.06 ХЕ.

При нарушениях функции почек

Противопоказано при остром гломерулонефрите и остром пиелонефрите.

Применение в детском возрасте

Применяется у детей по показаниям.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.

После растворения сухой микстуры в воде полученный раствор хранить при температуре не выше 12°С в защищенном от света месте не более 2-х суток. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности - 1.5 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Mikstura_Ot_Kashlya_Dlya_Detey_Suhaya