

Микстура От Кашля Для Детей Сухая



Код АТХ:

- [R05CA10](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Алтея лекарственного корней экстракт](#)
- [Аммония хлорид](#)
- [Аниса обыкновенного семян масло](#)
- [Натрия бензоат](#)
- [Натрия гидрокарбонат](#)
- [Солодки корней экстракт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН МНН МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ Порошок для приготовления раствора для приема внутри	1 бут.
экстракт алтея лекарственного	4 г
масло анисовое	50 мг
натрия гидрокарбонат	2 г
сухой экстракт корней солодки голой	1 г

19,55 г - бутылки стеклянные вместимостью 200 мл (1) - пачки картонные.

1,47 г - пакетики бумажные ламинированные (5) - пачки картонные.

1,47 г - пакетики бумажные ламинированные (10) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает отхаркивающее, противокашлевое и противовоспалительное действие.

Натрия гидрокарбонат сдвигает pH бронхиальной слизи в щелочную сторону, снижает вязкость мокроты; корень солодки, анисовое масло оказывают против-воспалительное и спазмолитическое действие; натрия бензоат и аммония хлорид оказывают отхаркивающее действие.

Способствует удалению слизи из дыхательных путей при кашле.

Показания к применению:

— в качестве отхаркивающего средства при заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (в т.ч. трахеит, бронхит, бронхопневмония).

Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Бронхопневмония](#)
- [Трахеит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата,
- острый гломерулонефрит;
- острый пиелонефрит;
- беременность;
- период грудного вскармливания;
- дефицит сахаразы/изомальтазы;
- непереносимость фруктозы;
- глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Способ применения и дозы:

Внутрь, **детям**: содержимое 1 пакета растворить в 15 мл (1 столовая ложка) охлажденной кипяченой воды. Принимать внутрь 3-4 раза в день после еды:

- детям до года - по 15-20 капель;
- детям 1-2 лет - по 40 капель;
- детям 3-4 лет - по 1/2 чанной ложки (2,5 мл);
- детям 5-6 лет - по 2/3 чанной ложки (3,75 мл);
- детям 7-8 лет - по 1 чайной ложке (5 мл);
- детям 9-12 лет - по 2 чайных ложки (10 мл);
- детям старше 12 лет - по 1 столовой ложке (15 мл).

Курс лечения 2-3 недели.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, тошнота, рвота, диарея; может оказывать раздражающее действие на слизистую оболочку желудка.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано при беременности и лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, снижающими образование мокроты.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакции.

Указания для больных сахарным диабетом: содержание углеводов в разовой дозе препарата соответствует 0.06 ХЕ.

При нарушениях функции почек

Противопоказано при остром гломерулонефрите и остром пиелонефрите.

Применение в детском возрасте

Применяется у детей по показаниям.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

После растворения сухой микстуры в воде полученный раствор хранить при температуре не выше 12°C в защищенном от света месте не более 2-х суток. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности - 1.5 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Mikstura_Ot_Kashlya_Dlya_Detey_Suhaya