Микстура от кашля для взрослых сухая

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Аммония хлорид
- Аниса обыкновенного семян масло
- Натрия бензоат
- Натрия гидрокарбонат
- Солодки корней экстракт
- Термопсиса ланцетного травы экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн мнн мнн мнн]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Порошок для приготовления раствора для приема внутрь*** коричневато-серого цвета с более светлыми включениями, с запахом анисового масла; водный раствор (1:10) - коричневого цвета.

	1 пак.
сухой экстракт термопсиса	0.045 г
сухой экстракт корней солодки голой	0.15 г
натрия бензоат	0.3 г
натрия гидрокарбонат	0.3 г
аммония хлорид	0.15 г

Вспомогательные вещества: масло анисовое 0.0037 г, сахароза до 1.70 г.

1.7 г - Пакетики из комбинированного материала.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает отхаркивающее, противовоспалительное действие.

Термопсиса экстракт сухой усиливает секрецию бронхиальных желез; солодки экстракт сухой оказывает противовоспалительное, отхаркивающее и спазмолитическое действие. Натрия гидрокарбонат сдвигает pH бронхиальной слизи в щелочную сторону, снижает вязкость мокроты; корень солодки оказывает противовоспалительное и спазмолитическое действие; натрия бензоат и аммония хлорид оказывают отхаркивающее действие.

Показания к применению:

— в качестве отхаркивающего средства при заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с

грудноотделяемой мокротой (в том числе трахеит, бронхит, бронхопневмония).

Относится к болезням:

- Бронхит
- Бронхопневмония
- Трахеит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— острый гломерулонефрит;

— острый пиелонефрит;

— беременность;

— период грудного вскармливания;

— дефицит сахаразы/изольматазы;

— непереносимость фруктозы;

— глюкозо-галактозная мальабсорбция;

— возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы:

Внутрь, **взрослым**: содержимое 1 пакета (разовая доза) растворить в 15 мл (1 столовая ложка) охлажденной кипяченой воды. Принимать внутрь 3-4 раза в день после еды. Курс лечения 2-3 недели.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, тошнота, рвота, диарея; может оказывать раздражающее действие на слизистую оболочку желудка.

Передозировка:

До настоящею времени о случаях передозировки не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, снижающими образование мокроты.

Особые указания и меры предосторожности:

Указание для больных сахарным диабетом: содержание углеводов в разовой дозе препарата соответствует 0.06 ХЕ.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при остром гломерулонефрите и остром пиелонефрите.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям и подросткам до 18 лет.

Условия хранения:

В сухом месте при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Mikstura_ot_kashlya_dlya_vzroslyh_suhaya