Мильгамма (драже)



Код АТХ:

- A11DB

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Лидокаин
- Пиридоксин
- Тиамин
- Цианокобаламин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] [МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] [МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Драже	**1 драже**
бенфотиамин	100 мг
пиридоксина гидрохлорид	100 мг

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, аэросил, натрия карбоксиметилцеллюлоза, тальк, повидон, глицериды жирных кислот, шеллак, сахароза, кальция карбонат, акации порошок, крахмал кукурузный, титана диоксид, полиэтиленгликоль-6000, глицерол, твин-80, гликолевый воск.

15 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
15 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, содержащий витамины группы В.

Бенфотиамин - жирорастворимая форма тиамина.

Тиамин - витамин B_1 - регулирует углеводный и белковый обмен в клетке, участвует в процессах жирового обмена, обладает антиоксидантной активностью, регулирует проведение нервного импульса, влияя на передачу возбуждения, способствует развитию анальгетического эффекта.

Пиридоксин - витамин B_6 - является кофактором для многих ферментов, действующих в клетках нервной ткани; участвует в декарбоксилировании, в дез- и переаминировании аминокислот, препятствует накоплению аммиака, участвует в синтезе нейромедиаторов (допамин, норадреналин, адреналин, гистамин и GABA).

Препарат ускоряет регенеративные процессы в нервной ткани.

Фармакокинетика

Бенфотиамин

После приема препарата внутрь бенфотиамин быстро абсорбируется из ЖКТ, C_{max} достигается ранее, чем через 1 ч. В клетках бенфотиамин накапливается в 5 раз активнее, чем водорастворимый тиамин. После биотрансформации в тиамин-дифосфат обладает кинетикой, не отличающейся от водорастворимого тиамина.

Показания к применению:

Симптоматическая терапия неврологических заболеваний:

— невриты;

— невралгии;

— полиневропатия (в т.ч. диабетическая и алкогольная);

— миалгии;

— корешковые синдромы;

— ретробульбарные невриты;

— опоясывающий герпес;

— парезы лицевого нерва;

— системные неврологические заболевания, обусловленные доказанным дефицитом витаминов B_1 и B_6.

Относится к болезням:

- Герпес
- Корешковый синдром
- Миалгия
- Невралгия
- Неврит
- Неврозы
- Полиневропатия

Противопоказания:

— сердечная недостаточность в стадии декомпенсации;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Назначают по 1 драже до 3 раз/сут в течение 1 месяца.

Препарат следует принимать с достаточным количеством жидкости.

Побочное действие:

Со стороны сердечно-сосудистой системы: в отдельных случаях - тахикардия.

Аллергические реакции: редко - кожная сыпь, крапивница, затрудненное дыхание, отек Квинке, анафилактический шок.

Прочие: в отдельных случаях - усиление потоотделения, угревая сыпь.

Передозировка:

Симптомы: возможно усиление проявлений описанных побочных эффектов.

Лечение: проводят промывание желудка, назначают активированный уголь внутрь; при необходимости проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При применении пиридоксина ежедневно в дозе до 25 мг нет противопоказаний к его применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Однако 1 драже препарата Мильгамма содержит 100 мг пиридоксина. Поэтому применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не рекомендуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении Мильгамма снижает антипаркинсоническое действие леводопы, что связано с усилением периферического декарбоксилирования леводопы под влиянием пиридоксина.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью следует назначать препарат одновременно с D-пеницилламином, циклосерином.

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Milgamma_drazhe