

Мильгамма (драже)



Код АТХ:

- [A11DB](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Лидокаин](#)
- [Пиридоксин](#)
- [Тиамин](#)
- [Цианокобаламин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Драже	1 драже
бенфотиамин	100 мг
пиридоксина гидрохлорид	100 мг

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, аэросил, натрия карбоксиметилцеллюлоза, тальк, повидон, глицериды жирных кислот, шеллак, сахароза, кальция карбонат, акации порошок, крахмал кукурузный, титана диоксид, полиэтиленгликоль-6000, глицерол, твин-80, гликолевый воск.

15 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

15 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, содержащий витамины группы В.

Бенфотиамин - жирорастворимая форма тиамина.

Тиамин - витамин В₁ - регулирует углеводный и белковый обмен в клетке, участвует в процессах жирового обмена, обладает антиоксидантной активностью, регулирует проведение нервного импульса, влияя на передачу возбуждения, способствует развитию анальгетического эффекта.

Пиридоксин - витамин В₆ - является кофактором для многих ферментов, действующих в клетках нервной ткани; участвует в декарбоксилировании, в дез- и переаминировании аминокислот, препятствует накоплению аммиака, участвует в синтезе нейромедиаторов (допамин, норадреналин, адреналин, гистамин и GABA).

Препарат ускоряет регенеративные процессы в нервной ткани.

Фармакокинетика

Бенфотиамин

После приема препарата внутрь бенфотиамин быстро абсорбируется из ЖКТ, C_{max} достигается ранее, чем через 1 ч. В клетках бенфотиамин накапливается в 5 раз активнее, чем водорастворимый тиамин. После биотрансформации в тиамин-дифосфат обладает кинетикой, не отличающейся от водорастворимого тиамина.

Показания к применению:

Симптоматическая терапия неврологических заболеваний:

- невриты;
- невралгии;
- полиневропатия (в т.ч. диабетическая и алкогольная);
- миалгии;
- корешковые синдромы;
- ретробульбарные невриты;
- опоясывающий герпес;
- парезы лицевого нерва;
- системные неврологические заболевания, обусловленные доказанным дефицитом витаминов В₁ и В₆.

Относится к болезням:

- [Герпес](#)
- [Корешковый синдром](#)
- [Миалгия](#)
- [Невралгия](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)
- [Полиневропатия](#)

Противопоказания:

- сердечная недостаточность в стадии декомпенсации;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Назначают по 1 драже до 3 раз/сут в течение 1 месяца.

Препарат следует принимать с достаточным количеством жидкости.

Побочное действие:

Со стороны сердечно-сосудистой системы: в отдельных случаях - тахикардия.

Аллергические реакции: редко - кожная сыпь, крапивница, затрудненное дыхание, отек Квинке, анафилактический шок.

Прочие: в отдельных случаях - усиление потоотделения, угревая сыпь.

Передозировка:

Симптомы: возможно усиление проявлений описанных побочных эффектов.

Лечение: проводят промывание желудка, назначают активированный уголь внутрь; при необходимости проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При применении пиридоксина ежедневно в дозе до 25 мг нет противопоказаний к его применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Однако 1 драже препарата Мильгамма содержит 100 мг пиридоксина. Поэтому применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не рекомендуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении Мильгамма снижает антипаркинсоническое действие леводопы, что связано с усилением периферического декарбоксилирования леводопы под влиянием пиридоксина.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью следует назначать препарат одновременно с D-пеницилламином, циклосерином.

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Milgamma_drazhe