Минисем



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капли назальные 0.01% бесцветные, прозрачные.

	1 мл
синтетическое пептидное соединение, содержащее 7 аминокислотных остатков (метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин)	100 мкг

3 мл - флаконы с крышкой-капельницей (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Минисем влияет на процессы, связанные с формированием памяти и обучением. Минисем усиливает избирательное внимание при обучении и анализе информации, улучшает мнестические функции; улучшает адаптацию организма к гипоксии, церебральной ишемии, наркозу и другим повреждающим воздействиям. В условиях нервно-психического истощения Минисем облегчает концентрацию внимания, улучшает операторскую деятельность и умственную работоспособность.

Фармакокинетика

Всасывание со слизистой оболочки полости носа 60-70%. Быстро распределяется во все органы и ткани, проникает через гематоэнцефалический барьер. Неизмененный препарат и/или его метаболиты не определяются в суточной моче.

Показания к применению:

— для лечения интеллектуально-мнестических расстройств, при сосудистых поражениях головного мозга у детей;

— при задержке психомоторного, развития перинатального генеза у детей раннего возраста (с 3-х месяцев и старше);

— при лечении невротических и когнитивных нарушений у детей дошкольного и младшего школьного возраста;

— для повышения адаптационных возможностей организма ребенка.

Относится к болезням:

- Неврит
- Неврозы

Противопоказания:

— индивидуальная непереносимость препарата;

— острые психотические состояния;

— беременность;

— период грудного вскармливания;

— склонность к судорогам;

— дети до 3-х месяцев (в связи с отсутствием данных).

Способ применения и дозы:

Минисем применяют интраназально, используя флакон-капельницу.

В каждой капле стандартного раствора содержится 5 мкг активного вещества.

Раствор препарата закапывают пипеткой в количестве не более 3 капель (15 мкг) за одно введение в каждый носовой ход 2-3 раза в день с интервалом 3-4 часа.

Разовая доза составляет от 1 до 3 капель (5-15 мкг) дробно с интервалом 10-15 мин до достижения терапевтической дозы 18 капель (90 мкг).

Препарат назначают- ежедневно в течение 3-5 дней. Длительность курсового применения препарата составляет 14 дней.

При необходимости курс лечения может быть повторен через 4 недели.

Побочное действие:

При повышенной чувствительности к препарату может появиться раздражение слизистой оболочки носа, кожная сыпь, нарушение сна, повышенная возбудимость, раздражительность, повышение артериального давления, аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Нежелательно применение с интраназальными препаратами с местным сосудосуживающим действием.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 3-х месяцев.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре не выше +10°С. Не допускать замораживания. Хранить в местах,

недоступных для детей. Срок годности - 1 год.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Minisem