Миовью



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Тетрофосмин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Диагностическое средство для определения кровоснабжения миокарда. Фармакологических эффектов после в/в введения в рекомендованной дозе не ожидается.

Фармакокинетика

Максимальное накопление в миокарде отмечается через 5 мин (составляет 1.2% от введенной активности) и сохраняется до 4 ч. Выводится почками (40%) и через кишечник (26%), 66% введенного препарата - в течение 48 ч.

Показания к применению:

Оценка перфузии миокарда при диагностике ишемии и инфаркта миокарда.

Относится к болезням:

- Миокардит

Противопоказания:

Беременность, повышенная чувствительность к активному веществу.

Способ применения и дозы:

Планарное или ОФЭКТ (однофотонный эмиссионный компьютерный томограф) исследование начинают через 15 мин после инъекции. Для диагностики и определения локализации ишемии миокарда рекомендуется 2-кратное введение. Взрослым на высоте нагрузки вводится 185-250 МБк, затем через 4 ч - 500-750 МБк в покое. Введенная активность не должна превышать 1000 МБк в течение одного дня. Для диагностики локализации инфаркта миокарда достаточно 185-250 МБк в покое (1 инъекция).

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции, жар, тошнота, металлический привкус во рту, нарушение обоняния, жжение во рту; лейкоцитоз (транзиторный).

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности противопоказано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При применении на фоне лечения бета-адреноблокаторами, блокаторами медленных кальциевых каналов возможны ложноотрицательным результаты исследования.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение возможно только квалифицированным персоналом в специализированном отделении в условиях антисептики.

С осторожностью применять у детей.

Применение в детском возрасте

С осторожностью применять у детей.

Источник: http://drugs.thead.ru/Miovyu