

[Мирамистин-Дарница](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептическое средство, оказывает противовирусное и бактерицидное действие (гидрофобное взаимодействие с мембранами микроорганизмов приводит к их разрушению). Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных, аэробных и анаэробных, спорообразующих и аспорогенных бактерий в виде монокультур и микробных ассоциаций, включая госпитальные штаммы с полирезистентностью к антибиотикам.

Наиболее высокой чувствительностью к препарату обладают: грамположительные микроорганизмы (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Bacillus anthracoides*, *Bacillus subtilis*); грамотрицательные микроорганизмы: *Neisseria* spp., *Escherichia* spp., *Shigella* spp. (в т.ч. Зонне, Флекснера), *Salmonella* spp. (брюшного тифа, паратифа А и В, возбудители пищевых токсикоинфекций), *Vibrio* spp. (в т.ч. холерный, НАГ, парохолерный, парагемолитический), *Treponema pallidum*, *Corynebacterium diphtheriae*; грибы (*Candida albicans*, *Candida tropicalis*, *Trichophyton rubrum*, *Microsporum lanosum*, *Aspergillus niger*); простейшие (*Chlamydia trachomatis*, *Chlamydia pneumonia*).

Показания к применению:

- гнойные раны в хирургической и акушерской практике;
- ожоги (поверхностные и глубокие);
- воспалительные заболевания женских половых органов;
- заболевания, передающиеся половым путем (сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес);
- уретрит (острый и хронический), уретропростатит специфической (трихомониаз, хламидиоз, гонорея) и неспецифической природы;
- периодонтит, стоматит, гигиеническая обработка съемных зубных протезов;
- отит (острый и хронический), гайморит, тонзиллит, ларингит;
- грибковые поражения кожи и слизистых оболочек.

Относится к болезням:

- [Герпес](#)
- [Гонорея](#)
- [Ларингит](#)
- [Ожоги](#)
- [Отит](#)
- [Поражения кожи](#)
- [Раны](#)
- [Сифилис](#)
- [Стоматит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Трихомониаз](#)
- [Уретрит](#)

Противопоказания:

Гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Местно и наружно. При гнойных ранах и ожогах - наложение марлевых повязок, смоченных 0.01% раствором.

При *острых и хронических уретритах и уретропростатитах* раствор вводят в мочеиспускательный канал в объеме 2-5 мл 2-3 раза/сут в течение 5-7 дней (в комплексе с др. препаратами).

Для профилактики инфицирования *послеродовых травм* интравагинально вводят тампоны, смоченные в 50 мл раствора, с экспозицией 2 ч в течение 7 дней.

Для профилактики заболеваний, передающихся половым путем, перед применением следует помочиться, вымыть руки и половые органы. Затем отвинчивают крышку флакона, надавливая на стенки, струей раствора обрабатывают кожу лобка, внутренних поверхностей бедер, половых органов. Носик насадки вводят в наружное отверстие мочеиспускательного канала и выдавливают 1.5-3 мл (мужчины) и 1-1.5 мл (женщины), во влагалище - 5-10 мл. Не разжимая пальцы, насадку извлекают из отверстия мочеиспускательного канала, а раствор задерживают на 2-3 мин.

После процедуры не рекомендуется мочиться в течение 2 ч. Профилактически эффективен, если процедура не позднее 2 ч после полового акта.

Побочное действие:

Аллергические реакции. Местно - чувство жжения в месте применения (проходит самостоятельно в течение 10-15 с и не требует отмены препарата).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с антибиотиками отмечено снижение резистентности микроорганизмов к последним.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Miramistin-Darnica>