

## Миропристон



### **Код АТХ:**

- [G03XB01](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Мифепристон](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>

[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

**Таблетки** светло-желтого цвета или светло-желтого цвета с зеленоватым оттенком, плоскоцилиндрические, с риской и фаской.

	<b>1 таб.</b>
мифепристон	200 мг

*Вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая - 264.4 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 54 мг, тальк - 16.2 мг, кальция стеарат - 5.4 мг.

2 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.  
3 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.  
3 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.  
2 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.  
3 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.  
6 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Гормоны и их антагонисты](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Препарат представляет собой синтетический стероидный антигестаген. Блокирует действие прогестерона на уровне рецепторов. Гестагенной активностью не обладает, отмечается антагонизм с ГКС (за счет конкуренции на уровне связи с рецепторами).

Повышает сократительную способность миометрия, стимулируя высвобождение интерлейкина-8 в хориоидидаульных клетках и повышая чувствительность миометрия к простагландинам. В результате действия препарата происходит десквамация децидуальной оболочки и выведение плодного яйца.

**Фармакокинетика****Всасывание**

После однократного приема внутрь в дозе 600 мг  $C_{max}$  достигается через 1.3 ч и составляет 1.98 мг/л. Абсолютная биодоступность составляет 69%.

**Распределение**

Связывание с белками плазмы крови составляет 98% (с альбумином и кислым  $\alpha_1$ -гликопротеином).

**Выведение**

$T_{1/2}$  - 18 ч. Выведение осуществляется в две фазы: сначала медленное выведение препарата в течение 12-72 ч (концентрация мифепристона в плазме крови уменьшается в 2 раза), затем фаза быстрого выведения препарата.

**Показания к применению:**

- прерывание маточной беременности на ранних сроках (до 42 дней amenorei) в сочетании с мизопростолом;
- подготовка и индукция родов.

**Относится к болезням:**

- [Аменорея](#)

**Противопоказания:**

- надпочечниковая недостаточность;
- длительное применение ГКС;
- острые или хроническая почечная недостаточность;
- острые или хроническая печеночная недостаточность;
- порфирия;
- миома матки (для данной лекарственной формы);
- анемия (уровень гемоглобина менее 100 г/л);
- нарушения гемостаза (в т.ч. предшествующая терапия антикоагулянтами);
- острые воспалительные заболевания женских половых органов;
- наличие тяжелой экстрагенитальной патологии;
- курящие женщины старше 35 лет (без предварительной консультации терапевта);
- наличие в анамнезе повышенной чувствительности к мифепристону.

**Для медикаментозного прерывания беременности**

- подозрение на внemаточную беременность;
- беременность, не подтвержденная клиническими исследованиями;
- беременность сроком более 42 дней amenorei;
- беременность, возникшая на фоне применения внутриматочной контрацепции или после отмены гормональной контрацепции.

**Для подготовки и индукции родов**

- гестоз тяжелой степени;
- преэклампсия;

- эклампсия;
- недоношенная или переношенная беременность;
- несоответствие размеров таза матери и головки плода;
- аномальное положение плода;
- кровянистые выделения во время беременности из половых путей неуточненной этиологии;
- преждевременное излитие околоплодных вод;
- тяжелые формы гемолитической болезни плода.

С осторожностью следует назначать препарат при хронических обструктивных заболеваниях легких, бронхиальной астме, артериальной гипертензии, нарушениях ритма сердца, сердечной недостаточности.

## **Способ применения и дозы:**

Препарат должен применяться только в лечебных учреждениях, которые имеют соответствующим образом подготовленные врачебные кадры и необходимое оборудование.

Для медикаментозного прерывания беременности на ранних сроках препарат назначают в дозе 600 мг (3 таб.) однократно. В присутствии врача препарат принимают внутрь через 1-1.5 ч после приема пищи (легкий завтрак), запивая 100 мл кипяченой воды. Через 36-48 ч после приема Миропристона пациентка должна явиться в лечебное учреждение для приема мизопростола в дозе 400 мкг. После приема мизопростола необходимо динамическое наблюдение врача в течение 2 ч. Через 10-14 дней повторно проводится клиническое обследование и УЗИ-контроль, в случае необходимости определяют уровень хорионического гонадотропина для подтверждения аборта.

При отсутствии эффекта от применения препарата на 14 день (неполный аборт или продолжающаяся беременность) проводят вакуум-аспирацию с последующим гистологическим исследованием аспираата.

Для подготовки и индукции родов препарат назначают в дозе 200 мг (1 таб.) в присутствии врача. Через 24 ч следует повторно назначить препарат в дозе 200 мг. Через 48-72 ч проводят оценку состояния родовых путей и при необходимости назначают простагландины или окситоцин.

## **Побочное действие:**

*Связанные с приемом Миропристона:* чувство дискомфорта внизу живота, общая слабость, головная боль, тошнота, рвота, головокружение, гипертермия, крапивница.

*Связанные с процедурой медикаментозного аборта:* кровянистые выделения из половых путей, боли внизу живота, обострение воспалительных процессов матки и придатков.

## **Передозировка:**

Прием Миропристона в дозах до 2 г не вызывает нежелательных реакций. В случаях передозировки препарата может наблюдаваться надпочечниковая недостаточность.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат используется для прерывания маточной беременности на ранних сроках (до 42 дней amenorei) в сочетании с мизопростолом, а также для подготовки и индукции родов.

При назначении препарата следует прекратить грудное вскармливание на 3 дня после приема Миропристона в случае медикаментозного аборта.

Использование Миропристона для подготовки шейки матки к родам не влияет на последующую лактацию.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении Миропристона и ГКС необходимо увеличить дозу последних.

Следует избегать одновременного приема Миропристона с НПВС.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Пациентки, использующие Миропристон для прерывания беременности на ранних сроках, должны быть проинформированы, что если на 10-14 день эффект от применения препарата отсутствует (неполный аборт или продолжающаяся беременность), беременность следует обязательно прервать иным способом из-за риска формирования врожденных пороков развития у плода.

Применение препарата требует предупреждения резус-аллоиммунизации и других общих мероприятий, сопутствующих аборту.

### **При нарушениях функции почек**

Противопоказание: острые или хронические почечные недостаточности.

### **При нарушениях функции печени**

Противопоказание: острые или хронические печеночные недостаточности.

### **Применение в пожилом возрасте**

У пожилых пациенток не применяется.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C. Срок годности – 5 лет. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Miropriston>