# Миртилене форте



## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Черники обыкновенной плоды

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

***Капсулы*** мягкие желатиновые, овальные, темно-коричневого цвета со слегка блестящей гладкой поверхностью.

| | **1 капс.** |
|---|---|
| сухой экстракт плодов черники | 177 мг |

*Вспомогательные вещества:* масло соевое, жиры растительные гидрогенизированные, желатин, глицерол, железа оксид красный, железа оксид черный, натрия этилпарагидроксибензоат, натрия пропилпарагидроксибензоат.

20 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Препарат, улучшающий функциональное состояние сетчатки, для системного применения.

Антоцианозоды черники (Vaccinium myrtilus) стимулируют синтез и регенерацию родопсина (светочувствительного пигмента сетчатки), повышая ее чувствительность к изменениям интенсивности света.

Улучшает остроту зрения и адаптацию к темноте при пониженной освещенности.

Способствует улучшению кровоснабжения сетчатки.

## Показания к применению:

— миопия средней и высокой степени;

— приобретенная гемералопия;

— диабетическая ретинопатия;

— нарушение механизмов адаптации зрения к темноте (при ночном и сумеречном зрении);

— мышечная астенопия;

— центральная атеросклеротическая дегенерация сетчатки типа Кунт-Юниуса;

— тапеторетинальная абиотрофия сетчатки (пигментная дегенерация сетчатки).

## Относится к болезням:

- Астения
- Астенопия
- Атеросклероз
- Миопия
- Ретинопатия

## Противопоказания:

— индивидуальная повышенная чувствительность к активному веществу препарата или к каким-либо вспомогательным ингредиентам, входящим в его состав.

## Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь по 1 капсуле 3 раза/сут. Курс лечения - 1 мес.

## Побочное действие:

*Возможны:* аллергические реакции.

## Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Миртилене форте не сообщалось.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

В настоящее время отсутствуют достоверные данные по применению препарата Миртилене форте при беременности и в период лактации (грудного вскармливания). Поэтому применять препарат у данных категорий пациентов следует только, если ожидаемая польза превышает потенциальный риск.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Миртилене форте не описано.

## Особые указания и меры предосторожности:

В настоящее время отсутствуют достоверные данные по применению препарата Миртилене форте у детей. Поэтому применять препарат у этой категории пациентов следует только, если ожидаемая польза превышает потенциальный риск.

***Применение в детском возрасте***

В настоящее время отсутствуют достоверные данные по применению препарата Миртилене форте у детей. Поэтому применять препарат у этой категории пациентов следует только, если ожидаемая польза превышает потенциальный риск.

## Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

*Условия отпуска из аптек*

Препарат отпускается по рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Mirtilene_forte