

[Миртилене форте](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Черники обыкновенной плоды](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Капсулы мягкие желатиновые, овальные, темно-коричневого цвета со слегка блестящей гладкой поверхностью.

	1 капс.
сухой экстракт плодов черники	177 мг

Вспомогательные вещества: масло соевое, жиры растительные гидрогенизированные, желатин, глицерол, железа оксид красный, железа оксид черный, натрия этилпарагидроксibenзоат, натрия пропилпарагидроксibenзоат.

20 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат, улучшающий функциональное состояние сетчатки, для системного применения.

Антоцианозоды черники (*Vaccinium myrtillus*) стимулируют синтез и регенерацию родопсина (светочувствительного пигмента сетчатки), повышая ее чувствительность к изменениям интенсивности света.

Улучшает остроту зрения и адаптацию к темноте при пониженной освещенности.

Способствует улучшению кровоснабжения сетчатки.

Показания к применению:

- миопия средней и высокой степени;
- приобретенная гемералопия;

Миртилена форте

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- диабетическая ретинопатия;
- нарушение механизмов адаптации зрения к темноте (при ночном и сумеречном зрении);
- мышечная астенопия;
- центральная атеросклеротическая дегенерация сетчатки типа Кунт-Юниуса;
- тапеторетинальная абнотрофия сетчатки (пигментная дегенерация сетчатки).

Относится к болезням:

- [Астения](#)
- [Астенопия](#)
- [Атеросклероз](#)
- [Миопия](#)
- [Ретинопатия](#)

Противопоказания:

— индивидуальная повышенная чувствительность к активному веществу препарата или к каким-либо вспомогательным ингредиентам, входящим в его состав.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь по 1 капсуле 3 раза/сут. Курс лечения - 1 мес.

Побочное действие:

Возможны: аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Миртилена форте не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В настоящее время отсутствуют достоверные данные по применению препарата Миртилена форте при беременности и в период лактации (грудного вскармливания). Поэтому применять препарат у данных категорий пациентов следует только, если ожидаемая польза превышает потенциальный риск.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Миртилена форте не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

В настоящее время отсутствуют достоверные данные по применению препарата Миртилена форте у детей. Поэтому применять препарат у этой категории пациентов следует только, если ожидаемая польза превышает потенциальный риск.

Применение в детском возрасте

В настоящее время отсутствуют достоверные данные по применению препарата Миртилена форте у детей. Поэтому применять препарат у этой категории пациентов следует только, если ожидаемая польза превышает потенциальный риск.

Миртилене форте

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Условия отпуска из аптек

Препарат отпускается по рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Mirtilene_forte