# Мизол Эвалар



## Код АТХ:

- D01AE22

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Нафтифин

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru

## Форма выпуска:

***Форма выпуска, описание и состав***

***Раствор для наружного применения 1%*** прозрачный, бесцветный или почти бесцветный, с запахом этанола.

| | **1 мл** |
|---|---|
| нафтифина гидрохлорид | 10 мг |

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль - 50 мг, этанол (этиловый спирт) 95% - 400 мг, вода очищенная - 475 мг.

10 мл - флаконы-капельницы (1) - пачки картонные.
20 мл - флаконы-капельницы (1) - пачки картонные.
50 мл - бутылки (1) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***
Противогрибковое средство, относится к аллиламинам. Механизм действия связан с ингибированием биосинтеза эргостерола, что приводит к нарушению синтеза клеточной стенки возбудителя. Оказывает фунгицидное действие на дерматофиты, плесневые грибы, возбудителей споротрихоза. На дрожжевые грибы действует фунгицидно или фунгистатически в зависимости от конкретного штамма. Обладает противомикробной активностью в отношении различных грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, которые часто сочетаются с грибами. Оказывает противовоспалительное действие, уменьшает зуд. Характеризуется пролонгированным действием (до 24 ч).

## Показания к применению:

Онихомикозы, отрубевидный лишай, эпидермофитии крупных кожных складок и стоп, рубромикоз, трихофития, микроспория, кандидозы кожи, микозы со вторичной бактериальной инфекцией.

## Относится к болезням:

- Инфекции
- Лишай
- Микоз
- Отрубевидный лишай
- Эпидермофития

## Противопоказания:

Повышенная чувствительность к нафтифину.

## Способ применения и дозы:

Диагнозы

- Атопический дерматит
- Бородавки
- Витилиго
- Выпадение волос

## Побочное действие:

В *отдельных случаях:* в месте нанесения сухость и покраснение кожи, чувство жжения.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности в рекомендованных дозах не оказывает неблагоприятного действия на плод.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Mizol_Evalar