

## Мизол Эвалар



### Код АТХ:

- [D01AE22](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Нафтифин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр<sup>МНН</sup>](#) [Википедия<sup>МНН</sup>](#)  
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

### Форма выпуска:

#### Форма выпуска, описание и состав

**Раствор для наружного применения 1%** прозрачный, бесцветный или почти бесцветный, с запахом этанола.

	<b>1 мл</b>
нафтифина гидрохлорид	10 мг

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль - 50 мг, этанол (этиловый спирт) 95% - 400 мг, вода очищенная - 475 мг.

10 мл - флаконы-капельницы (1) - пачки картонные.

20 мл - флаконы-капельницы (1) - пачки картонные.

50 мл - бутылки (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Противогрибковое средство, относится к аллиламинам. Механизм действия связан с ингибированием биосинтеза эргостерола, что приводит к нарушению синтеза клеточной стенки возбудителя. Оказывает фунгицидное действие на дерматофиты, плесневые грибы, возбудителей споротрихоза. На дрожжевые грибы действует фунгицидно или фунгистатически в зависимости от конкретного штамма. Обладает противомикробной активностью в отношении различных грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, которые часто сочетаются с грибами. Оказывает противовоспалительное действие, уменьшает зуд. Характеризуется пролонгированным действием (до 24 ч).

## **Показания к применению:**

Онихомикозы, отрубевидный лишай, эпидермофитии крупных кожных складок и стоп, рубромикоз, трихофития, микроспория, кандидозы кожи, микозы со вторичной бактериальной инфекцией.

## **Относится к болезням:**

- [Инфекции](#)
- [Лишай](#)
- [Микоз](#)
- [Отрубевидный лишай](#)
- [Эпидермофития](#)

## **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к нафтифину.

## **Способ применения и дозы:**

Диагнозы

- Атопический дерматит
- Бородавки
- Витилиго
- Выпадение волос

## **Побочное действие:**

*В отдельных случаях:* в месте нанесения сухость и покраснение кожи, чувство жжения.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение при беременности в рекомендованных дозах не оказывает неблагоприятного действия на плод.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Mizol\\_Evalar](http://drugs.thead.ru/Mizol_Evalar)