

Мизол Эвалар



Код АТХ:

- [D01AE22](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Нафтифин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Раствор для наружного применения 1% прозрачный, бесцветный или почти бесцветный, с запахом этанола.

	1 мл
нафтифина гидрохлорид	10 мг

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль - 50 мг, этанол (этиловый спирт) 95% - 400 мг, вода очищенная - 475 мг.

10 мл - флаконы-капельницы (1) - пачки картонные.

20 мл - флаконы-капельницы (1) - пачки картонные.

50 мл - бутылки (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогрибковое средство, относится к аллиламинам. Механизм действия связан с ингибированием биосинтеза эргостерола, что приводит к нарушению синтеза клеточной стенки возбудителя. Оказывает фунгицидное действие на дерматофиты, плесневые грибы, возбудителей споротрихоза. На дрожжевые грибы действует фунгицидно или фунгистатически в зависимости от конкретного штамма. Обладает противомикробной активностью в отношении различных грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, которые часто сочетаются с грибами. Оказывает противовоспалительное действие, уменьшает зуд. Характеризуется пролонгированным действием (до 24 ч).

Показания к применению:

Онихомикозы, отрубевидный лишай, эпидермофитии крупных кожных складок и стоп, рубромикоз, трихофития, микроспория, кандидозы кожи, микозы со вторичной бактериальной инфекцией.

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)
- [Лишай](#)
- [Микоз](#)
- [Отрубевидный лишай](#)
- [Эпидермофития](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к нафтифину.

Способ применения и дозы:

Диагнозы

- Атопический дерматит
- Бородавки
- Витилиго
- Выпадение волос

Побочное действие:

В отдельных случаях: в месте нанесения сухость и покраснение кожи, чувство жжения.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности в рекомендованных дозах не оказывает неблагоприятного действия на плод.

Источник: http://drugs.thead.ru/Mizol_Evalar