

Мукофальк



Код АТХ:

- [A06AC01](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Подорожника овального семян оболочка](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Гранулы апельсиновые для приготовления суспензии для приема внутрь** светло-коричневого цвета с включениями из коричневых частичек кожуры и примыкающих клеток оболочки высушенных семян подорожника овального.

	5 г (1 пак.)
порошок оболочки семян подорожника овального (Plantago ovata Forssk.)	3.25 г

Вспомогательные вещества: сахароза - 0.4795 г, лимонная кислота - 0.435 г, декстрин - 0.294 г, натрия алгинат - 0.2515 г, натрия цитрат - 0.225 г, натрия хлорид - 0.015 г, натрия сахаринат - 0.01 г, ароматизатор апельсиновый - 0.04 г.

5 г - пакетики из ламинированного материала (20) - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Слабительный фитопрепарат. Гидрофильные волокна из оболочки семян подорожника удерживают жидкость в ЖКТ, за счет этого увеличивается объем и размягчается консистенция стула. Препарат регулирует деятельность кишечника, облегчая пассаж кишечного содержимого.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Мукофальк не предоставлены.

Показания к применению:

- запор (в т.ч. при беременности);
- анальные трещины;
- геморрой;
- послеоперационный период при вмешательствах в аноректальной области (в целях создания более мягкой консистенции стула);
- функциональная диарея;
- синдром раздраженного кишечника.

Относится к болезням:

- [Анальные трещины](#)
- [Геморрой](#)
- [Синдром раздраженного кишечника](#)

Противопоказания:

- органические стриктуры ЖКТ;
- кишечная непроходимость;
- декомпенсированный сахарный диабет;
- детский возраст до 12 лет;
- повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

Назначают внутрь, **взрослым и детям старше 12 лет** - по 1 пакетику или 1 чайной ложке 2-6 раз/сут.

Перед употреблением 1 пакетик или 1 чайную ложку гранул высыпают в стакан, который медленно наполняют холодной водой (150 мл), размешивают и сразу же выпивают, затем запивают еще одним стаканом жидкости.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

В первые дни лечения возможно усиление метеоризма и появление чувства переполнения в животе.

Передозировка:

Случаев передозировки препарата Мукофальк не выявлено.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Ограничений и противопоказаний по приему препарата при беременности и в период лактации нет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

На фоне лечения Мукофальком у больных с инсулинзависимым сахарным диабетом может потребоваться

Мукофальк

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

уменьшение дозы инсулина.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует назначать одновременно с противодиарейными препаратами, а также с препаратами, угнетающими моторику кишечника.

Следует соблюдать интервал в 30-60 мин между приемом Мукофалька и других препаратов.

При приеме препарата следует выпивать не менее 1.5 л жидкости в сутки.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям в возрасте до 12 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Mukofalk>