Мульти-Табс Тинейджер

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки жевательные*** (апельсиново-ванильные, кола и лимон, фруктовые) круглые, плоские, светло-серого цвета, с многочисленными вкраплениями различного цвета и интенсивности.

	1 таб.
ретинола ацетат (вит. A)	700 мкг (2333 МЕ)
α-токоферола ацетат (вит. E)	7 мг (10.43 МЕ)
колекальциферол (вит. D_3)	5 мкг (200 МЕ)
фитоменадион (вит. K)	30 мкг
аскорбиновая кислота (вит. C)	60 мг
тиамина нитрат (вит. B_1)	1 мг
рибофлавин (вит. B_2)	1.2 мг
пантотеновая кислота (в форме кальция пантотената) (вит. B_5)	5 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. B_6)	1.1 мг
фолиевая кислота (вит. B_c)	100 мкг
цианокобаламин (вит. B_{12})	1.4 мкг
никотинамид (вит. PP)	13 мг
биотин (вит. H)	30 мкг
кальций (в форме карбоната)	200 мг
магний (в форме оксида)	50 мг
железо (в форме фумарата)	10 мг
медь (в форме оксида)	700 мкг
цинк (в форме оксида)	7 мг
марганец (в форме сульфата)	2 мг
йод (в форме калия йодида)	90 мкг
селен (в форме натрия селената)	30 мкг
хром (в форме хлорида)	50 мкг

Неактивные ингредиенты, входящие в состав субстанций активных веществ: сахароза, желатин, крахмал модифицированный, крахмал кукурузный, бутилгидрокситолуол, натрия алюмосиликат, моно-, ди- и триглицериды, кремния диоксид, акации камедь, гипромеллоза, мальтодекстрин, натрия цитрат, лимонная кислота, вода.

Вспомогательные вещества: ксилитол, целлюлоза микрокристаллическая, стеариновая кислота, метилцеллюлоза, кремния диоксид коллоидный, вкусовой наполнитель (фруктовый, апельсиново-ванильный или кола с лимоном), кальция гидрофосфата дигидрат, калия ацесульфам, лимонной кислоты моногидрат, вода, неогесперидин, желатин, глицерол 85%, аскорбиновая кислота, крахмал кукурузный.

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (6) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (9) - пачки картонные.
15 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
15 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.
15 шт. - блистеры (6) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, содержащий комплекс витаминов и минералов, способствует нормализации обмена веществ, стимулирует иммунную защиту организма ребенка и помогает восстановлению после перенесенных заболеваний. Обеспечивает сбалансированное поступление в организм витаминов и минералов при неполноценном питании.

Витамин А способствует правильному росту и развитию организма. Повышает сопротивляемость организма к различным инфекциям. Нормализует зрительную функцию. Является важнейшим компонентом антиоксидантной защиты организма.

Витамин D_3 защищает костную ткань от остеопороза, переломов.

Витамин Е стимулирует и улучшает состояние иммунной системы.

Витамин B_1 является необходимым компонентом углеводного обмена в качестве составной части коэнзима для декарбоксилирования кетокислот; играет важную роль в углеводном, белковом и жировом обмене, участвует в проведении нервного возбуждения в синапсах.

Витамин B_2 участвует в обмене углеводов, белков и жиров, синтезе гемоглобина. Способствует хорошему функционированию кожных покровов, регенерации тканей, сохраняет нормальную структуру слизистых оболочек.

Витамин B_6 частвует в синтезе нейромедиаторов, поэтому имеет важное значение для нормальной функции центральной и периферической нервной системы.

Витамин B_{12} нобходим для нормального функционирования нервной системы и кроветворения.

Никотинамид эффективно снижает уровень общего холестерина, регулирует функции органов пищеварения. Оказывает мягкое седативное действие.

Пантотеновая кислота играет большую роль в регуляции процессов окисления и ацетилирования. Участвует в обмене углеводов и липидов. Способствует заживлению ран, стимулирует синтез антител.

Фолиевая кислота участвует в синтезе аминокислот, нуклеиновых кислот, пиримидинов, имеет важное значение в образовании гемоглобина в эритроцитах.

Витамин С способствует повышению сопротивляемости организма к различным инфекциям. Играет важную роль в синтезе кортикостероидных гормонов и гормонов щитовидной железы, ответственных за устойчивость и адаптацию организма к изменяющимся условиям внешней среды. Улучшает метаболизм липидов, способствуя нормализации обмена холестерина. Стимулирует синтез коллагена.

Биотин входит в состав ферментов, регулирующих белковый и жировой обмен, а также участвует в метаболизме глюкозы.

Витамин К участвует в механизме свертывания крови. Кроме этого, необходим для формирования таких белков, как остеокалыдин, который является важной составной частью костной ткани.

Кальций участвует в формировании костной ткани, увеличивает ее плотность, способствует минерализации костей, поддерживает нормальную работу нервной и мышечной системы, нормальную свертываемость крови, регулирует деятельность сердечно-сосудистой системы, повышает сопротивляемость организма, снижает аллергические реакции.

Магний участвует в регуляции сократительной функции миокарда.

Железо участвует в процессах кроветворения.

Цинк необходим для образования эритроцитов и других форменных элементов крови. Влияет на синтез половых гормонов. Стабилизирует иммунные процессы организма.

Медь является жизненно необходимым микроэлементом. Играет большую роль в метаболических процессах.

Марганец входит в состав нескольких ферментных систем, необходим для поддержания нормальной структуры костной ткани.

Хром участвует в процессе синтеза инсулина. Понижение содержания хрома в организме человека может вызвать резкие колебания уровня глюкозы в крови и способствовать развитию диабета.

Селен, благодаря антиоксидантным свойствам, предотвращает образование свободных радикалов, которые

оказывают повреждающее действие на организм.

Йод входит в состав гормонов щитовидной железы, которые выполняют жизненно важные функции. Регулируют деятельность мозга, нервной системы, половых и молочных желез, рост и развитие организма.

Показания к применению:

— для профилактики недостаточности витаминов и минеральных веществ у детей в возрасте от 11 до 17 лет;

— при повышенных умственных и физических нагрузках (период сдачи экзаменов, активные занятия спортом);

— период выздоровления после перенесенных заболеваний, в т.ч. инфекционных;

— период интенсивного роста и развития.

Относится к болезням:

- Инфекции

Противопоказания:

— детский возраст до 11 лет;

— гипервитаминоз A и D;

— индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Способ применения и дозы:

Детям от 11 до 17 лет - по 1 таб./сут. Принимать одновременно с приемом пищи или сразу после него.

Побочное действие:

В редких случаях возможны аллергические реакции на компоненты препарата.

Передозировка:

При применении в рекомендованных дозах симптомы передозировки не наблюдались.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период грудного вскармливания применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает риск для плода и младенца.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Во время приема препарата не рекомендуется прием других поливитаминных комплексов, с целью предотвращения передозировки.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме препарата возможно окрашивание мочи в ярко-желтый цвет, что совершенно безвредно и обусловлено наличием в составе препарата рибофлавина.

Возможно применение препарата у больных сахарным диабетом и лиц с непереносимостью глютена и лактозы.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 11 лет.

Условия хранения:

Хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Multi-Tabs_Tineydzher