Мульти-Табс В-Комплекс



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые пленочной оболочкой*** красно-коричневого цвета, круглые, двояковыпуклые.

	1 таб.
тиамина мононитрат (вит. B_1)	15 мг
рибофлавин (вит. B_2)	15 мг
пантотеновая кислота (в форме кальция пантотената) (вит. B_5)	30 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. B_6)	15 мг
фолиевая кислота (вит. B_c)	200 мкг
цианокобаламин (вит. B_{12})	5 мкг
никотинамид (вит. PP)	60 мг

Неактивные ингредиенты, входящие в состав субстанций активных веществ: мальтодекстрин, натрия цитрат, лимонная кислота, вода.

Вспомогательные вещества: кальция сульфата дигидрат, крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая, желатин, глицерол 85%, магния стеарат, стеариновая кислота, кальция гидрофосфата дигидрат, кремния диоксид коллоидный, хлористоводородная кислота концентрированная.

Состав оболочки: гипромеллоза 3, гипромеллоза 15, тальк, железа оксид желтый (E172), железа оксид красный (E172).

60 шт. - банки пластмассовые (1) - пачки картонные.
100 шт. - банки пластмассовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный поливитаминный комплекс. Действие препарата определяется свойствами витаминов, входящих в его состав.

Витамин B_1 (тиамин) является необходимым компонентом углеводного обмена в качестве составной части коэнзима для декарбоксилирования кетокислот; играет важную роль в углеводном, белковом и жировом обмене, участвует в проведении нервного возбуждения в синапсах. Недостаточность тиамина вызывает нарушение деятельности периферической и центральной нервной системы, а также нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы.

Витамин B_2 (рибофлавин) является незаменимым компонентом многих флавопротеиновых ферментов, участвующих в окислительных процессах. Рибофлавин способствует улучшению состояния слизистых оболочек ротовой полости, глаз, кожи, улучшает состояние нервной системы.

Витамин B_6 (пиридоксина гидрохлорид) обладает жизненноважным влиянием на обмен белков, углеводов и жиров и необходим для нормального обмена веществ, кроветворения, нормального функционирования центральной и периферической нервной системы.

Витамин B_{12} (цианокобаламин) необходим для жизнедеятельности клеток организма. Наибольшую потребность в B_{12} проявляют клетки костного мозга, нервной системы и кишечного тракта. Цианокобаламин необходим для нормального функционирования нервной системы, кроветворения.

Витамин PP (никотинамин) является компонентом НАД и НАДФ, которые участвуют в переносе водородного иона при синтезе жирных кислот, во время гликолиза и тканевого дыхания, играет жизненно важное значение для клеточного метаболизма. Никотинамид нормализует функции ЖКТ; показан при нарушениях функций центральной и периферической нервной системы, связанных с недостаточностью никотинамида.

Пантотеновая кислота - является важным компонентом кофермента А, необходима в обмене углеводов и жирных кислот, участвует в синтезе стероидных гормонов, порфинов и ацетилхолина.

Фолиевая кислота - трансформируется в организме в тетрагидрофолиевую кислоту, являющуюся коэнзимом реакций, в которых участвуют отдельные углеводные атомы для синтеза пуринов и пиримидинов. Дефицит фолиевой кислоты приводит к снижению интеллектуальных возможностей.

Показания к применению:

Профилактика и лечение гиповитаминозов, состояний сопровождающихся повышенной потребностью в витаминах группы B:

— период восстановления после тяжелых соматических и инфекционных заболеваний;

— синдром хронической усталости;

— профилактика астенических и невротических состояний, стресса;

— полиневриты различной этиологии, невралгии;

— дерматиты и дерматозы различной этиологии.

Относится к болезням:

- Астения
- Дерматит
- Инфекции
- Невралгия
- Неврит
- Неврозы

Противопоказания:

— индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Способ применения и дозы:

Если не назначена иная схема дозирования, то рекомендуется назначать **взрослым и детям старше 12 лет** по 1 таб. 1-3 раза/сут.

Принимать одновременно с приемом пищи или сразу после него.

Для *профилактики и лечения диабетической полинейропатии, полиневритов различной этиологии, невралгии* - по 1-2 таб. 3 раза/сут. Минимальный курс - 2-3 месяца.

Побочное действие:

В редких случаях возможны аллергические реакции на компоненты препарата.

Особые указания и меры предосторожности:

Во время приема препарата не рекомендуется прием других поливитаминных комплексов, с целью профилактики передозировки.

Комплекс витаминов группы В снижает противопаркинсоническую эффективность леводопы.

Алкоголь резко снижает всасывание тиамина.

Не следует превышать указанную дневную дозу.

Условия хранения:

Хранить в в недоступных для детей, сухом месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Multi-Tabs_V-Kompleks